

Препаратлар Қўлланмаси





"IFODA" компанияси Республикамизнинг қишлоқ хўжалиги соҳасига илғор ва инновацион технологияларни жорий қилишда ўз ҳиссасини қўшиб келаётган етакчи компаниялардан бири ҳисобланади. Компаниямиз бир неча йиллардан буён экинларни турли зарар-қунанда, касаллик ва бегона ўтлардан ҳимоя қилишда деҳқон ва фермер хўжаликларига амалий жиҳатдан қўмаклашиб келмоқда.

Жумладан, компаниямиз **2017** йилдан бошлаб ўсимликларни ҳимоя қилиш воситаларини Республикамиз ҳудудида ишлаб чиқаришни йўлга қўйди ва **2018** йилда яна бир янги лойиҳа – Қишлоқ хўжалиги учун мураккаб ўғитларни ишлаб чиқариш лойиҳаси амалга оширилди.

Ҳозирда компаниямизда **50** дан ортиқ турдаги ўғитларни ишлаб чиқариш йўлга қўйилган. Бу ўғитларнинг ўзига хослиги шундаки, таркибида ўсимлик учун зарур бўлган барча моддалар ва микроэлементлар мавжуд бўлган, ўсимлик ўзлаштириши учун энг қулай бўлган хелатланган шакллардаги янги авлод ўғитларидир.

Бизнинг маҳсулотларимизни қўллаб, юқори ҳосилдорликка эришсангиз – биз ўз олдимизга қўйган мақсадимизга эришган бўламиз. Зеро, бизнинг шиоримиз – **Биргаликда етиштирамиз!**



МУНДАРИЖА

Гербицид:

Энтостар.....	4
Энтостар Плюс.....	5
Энторане Экстра.....	6
Энтопик.....	7
Энто Супер.....	8
Пинокс.....	9
Энтогарт.....	10
Энтостоп.....	11
Энтоглифос.....	12
Стапл.....	13
Зелдек Экстра.....	14
Клетон.....	15
Энтус.....	16
Гербис Про.....	17
Корнет Экстра.....	18
Оксигол.....	19
Фастер.....	20
Фастер Альфа.....	21
Бентогран.....	22
Ландаск.....	23
Сурис.....	24
Йокозуна.....	25

Инсектицид / Акарицид:

Далате.....	26
Далате Плюс.....	27
Эквадор.....	28
Римида.....	29
Энтоспилан.....	30
Агрофос-Д.....	31
Агрофос Экстра.....	32
Мерган.....	33
Энтомин.....	34
Демофос.....	35
Энтометрин.....	36
Делтасис.....	37
Энтометктин.....	38
Энтометктин Экстра.....	39
Энтосоран.....	40
Спиромектин.....	41

Акараголд.....	42
Энтомайт.....	43
Энтовант.....	44
Промайт.....	45
Эзотокс.....	46
Индоксамектин.....	47
Эвисект.....	48
Протект.....	49
Протект Про.....	50
Энтовант Про.....	51
Энтолучо.....	52
Энтовет.....	53
Эзофокс.....	54
Таксам.....	55
Милитар.....	56
Ин-То.....	57
Энтовидор.....	58
Флур.....	59
Лоадер.....	60
Профентрин.....	61
Дуэт Экстра.....	62
Ифо Сера.....	63

Фунгицид:

Ифо бордо.....	64
Энтохлорок.....	65
Энтохлорок Плюс.....	66
Энтохлорок Экстра.....	67
Энотликур.....	68
Топ Кроп.....	69
Прозолин.....	70
Энтопаз Экстра.....	71
Флусил.....	72
Капитокс.....	73
Ифододин.....	74
Рамзес.....	75
Лековит.....	76
Мерсин.....	77
Гемаксил.....	78

Фосетал.....	79
Ентревицур.....	80
Флутрифул.....	81
Арамис.....	82
Аксесс.....	83
Адресс.....	84
Крезоксин.....	85
Ентобронат.....	86
Ифо Тебу.....	87

Стимулятор

Ентовакс.....	88
Ентопикс.....	89
Энтожин.....	90
Хосилин.....	91
Экс-Чейндж.....	92
Сиклодефол.....	93
Енто-Дефол.....	94
Сильвер.....	95
Оксидат.....	96
Болл.....	97



ENTOSTAR

Гербицид

(Трибенурон-метил 75%)

Бир йиллик икки паллали бегона ўтларга қарши қўлланиладиган гербицид!



Таъсир этиш хусусияти:

Кузги ҳамда баҳорги галла майдонларидаги бир йиллик кенг баргли бегона ўтларга қарши курашда қўлланилади. Препарат жағ-жағ, шўра, сассиқноя, қуртена, салатўт, мойчечак, лолақизғалдоқ, аччиқўт, тиласпи, аччиқмия, қизилтасма, бангидевона, исмалоқ ва бошқа бегона ўтларни йўқотишда юқори самарали гербицид.

Сарф меъёрлари ва қўллаш тартиби

Экин тури	Бегона ўтлар	Сарф меъёри (г/га)	Қўллаш муддати ва усуллари	
			Экиннинг ўсиш даври	Бегона ўтнинг ўсиш даври
Кузги буғдой	Бир йиллик икки паллали бегона ўтлар	10-20	Найчалаш давригача, 2-3 тагача барг	Униб чиққандан сўнг. Бегона ўтлар ривожланишининг бошланғич даврида қўлланилса, яхши самара беради



ENTOSTAR Plus

Гербицид

**(Трибенурон-метил 37,5 % +
Тифенсуронметил 37,5 %)**

**Ғалладага бир йиллик ва кўп
йиллик икки паллали бегона
ўтларга қарши қўлланиладиган
самарали гербицид!**



Таъсир этиш хусусияти:

Кузги ҳамда баҳорги ғалла майдонларидаги бир йиллик ва кўп йиллик кенг баргли бегона ўтларга қарши курашадиган юқори самарали гербицид. Препарат қўйпечак, отқулоқ, жаж-жағ, шўра, сассиқлоя, қуртена, салатўт, мойчечак, лолақизғалдоқ, аччиқўт, тиласпи, аччиқмия, қизилтасма, бангидевона, исмалоқ каби бегона ўтларга қарши курашда юқори самарали.

Сарф меъёрлари ва қўллаш тартиби

Экин тури	Бегона ўтлар	Сарф меъёри (г/га)	Қўллаш муддати ва усуллари	
			Экиннинг ўсиш даври	Бегона ўтнинг ўсиш даври
Кузги бугдой	Бир йиллик ва кўп йиллик икки паллали бегона ўтлар	30	2-3 тагача баргдант найчалаш давригача	Униб чиққандан сўнг. Бегона ўтлар ривожланишининг бошланғич даврида қўлланилса, яхши самара беради

ENTORANE Ekstra

Гербицид

(Флуроксипур 40%)

Бир йиллик ва кўп йиллик икки паллали бегона ўтларга қарши курашда қўлланиладиган самарали гербицид!



Таъсир этиш хусусияти:

Ғалла ва маккажўхори экинлари экилган майдонларидаги бир йиллик ва кўп йиллик кенг баргли ўтларга юқори даражада самара берувчи гербициддир. Препарат кўйпечак, жағ-жағ, латтатикон, сассикроя, қуртена, салатўт, чумчуқтил, мойчечак, ёввойи турп, аччиқўт, юлдузўт турлари, тиласпи, олабўта, аччиқмия, қизилтасма, бангидевона, исмалоқ, отқулоқ, пушти какра каби бегона ўтларга қарши юқори самара беради.

Сарф меъёрлари ва қўллаш тартиби

Экин тури	Бегона ўтлар	Сарф меъёри (л/га)	Қўллаш муддати ва усуллари	
			Экиннинг ўсиш даври	Бегона ўтнинг ўсиш даври
Буғдой	Бир йиллик ва кўп йиллик икки паллали бегона ўтлар	0,5-0,6	Найчалаш давригача, 2-3 тагача барг чиқарганда	Униб чиққандан сўнг. Бегона ўтлар ривожланишининг бошланғич даврида қўлланилса, яхши самара беради



ENTOPIK

Гербицид

**(Кладинафоп пропаргил + антидот
клоквинтоцет мексил 8%)**

**Ғалла майдонларидаги бир йиллик
бошоқли бегона ўтларга қарши
қўлланиладиган гербицид!**



Таъсир этиш хусусияти:

Бугдой экилган майдонларда униб чиққан бир йиллик бошоқли бегона ўтларга қарши самарали гербицид. Ёввойи сули (оқ бош), тулки қуйруқ, итқуноқ турлари, курмак сингари бир йиллик бошоқли бегона ўтларни йўқотишда самаралидир.

Сарф меъёрлари ва қўллаш тартиби

Экин тури	Бегона ўтлар	Сарф-меъёр (л/га)	Қўллаш муддати ва усуллари	
			Экиннинг ўсув даври	Бегона ўтларнинг ўсув даври
Кузги бугдой	Бир йиллик бошоқли бегона ўтлар (ёввойи сули)	0,3-0,5	Экиннинг туپлаш даврида	Униб чиққан бегона ўтларнинг илк ривожланиши даврида қўлланилса яхши самара беради

ENTO SUPER

Гербицид

**(Феноксапроп-п-этил
+ антидот 7,5%)**

**Ғўза майдонларидаги кенг баргли
бегона ўтларга қарши гербицид!**



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат ғалла майдонларидаги бир йиллик бошоқли ўтларни назорат қилиш учун селектив ва тизимли гербицид. Бугдой экинларига ножўя салбий таъсири йўқ. Барг орқали қўлланилганда бир неча соат ичида бегона ўт танасига сўрилади ва ўсув нуқталарида тўпланади. Бегона ўтларнинг тўлиқ қуриб nobуд бўлиш даври 1-3 ҳафта давомида қузатилади.

Сарф меъёрлари ва қўллаш тартиби

Экин тури	Бегона ўт тури	Сарф меъёри (л/га)	Қўллаш муддати ва усуллари	
Бугдой	Бир йиллик бошоқли бегона ўтлар (ёввойи сули)	0,8-1,0	Экиннинг ўсув даври	Бегона ўтнинг ўсув даври
			Экиннинг тулплаш даврида	Бегона ўтлар ривожланишининг бошлангич даврида қўлланилса, қутилган натижани беради.



PINOKS

Гербицид

**(Пиноксаден 2.5% +
Клодинофоп пропаргил 2.5% +
Клоквинтосет мексил 0.8%)**

*Галла майдонларидаги бир йиллик
бошоқли бегона ўтлар, айниқса, ёввойи
сули, тулқидум, райграсс бегона
ўтларга қарши селектив гербицид.*



Таъсир этиш хусусияти:

Пинокс бугдойдаги бир йиллик бошоқли бегона ўтларга қарши ичдан таъсир этувчи гербицид бўлиб, бегона ўтларнинг барглари орқали сингиб, ўсув нуқтаси томон ҳаракатланади. Ўсув нуқтасидаги ҳужайралар бўлинишини тўхтатиб, бир неча соат ичида ўсимликни ўсишдан тўхтатади. Препаратнинг таъсир кучи ишловдан 3-5 кундан сўнг кўзга ташланади, бегона ўтларнинг тўлиқ нобуд бўлиши 10-12 кунда содир бўлади.

Сарф-меъёри ва қўллаш тартиби

Экин тури	Бегона ўтлар	Сарф меъёр (л/га)	Қўллаш муддати ва усуллари	
			Экиннинг ўсув даври	Бегона ўтларнинг ўсув даври
Кузги бугдой	Бир йиллик бошоқли бегона ўтлар (ёввойи сули, райграсс)	1,0-1,2	Экиннинг туплаш даври	Униб чиққандан сўнг, бегона ўтларнинг илк ривожланиши даврида қўлланилса яхши самара беради

ENTOGART

Гербицид

(Прометрин 50 %)

**Бир йиллик икки паллали
ва бошоқли бегона ўтларга
қарши қўлланиладиган гербицид!**



Таъсир этиш хусусияти:

Бир йиллик икки паллали, ғўза, картошка, маккажўхори ва сабзидида қўлланилганда юқори самара берадиган гербициддир. Бир йиллик икки паллали униб чиқмасидан олдин ва урув экиш билан бир вақтда қўлланилади. Фақатгина уна бошлаган урув ёки майсани эмас, балки 2-3 дона барг чиқарган, препарат таъсирига мойил бўлган бир йиллик икки паллали ва майсаларини ҳам нобуд қилади.

Сарф меъёрлари ва қўллаш тартиби

Экин тури	Бегона ўтлар	Сарф меъёри (л/га)	Қўллаш муддати ва усуллари
Ќўза (плёнка остига экилганда)	Бир йиллик икки паллали ва бошоқли бегона ўтлар	1,0-1,5	Экинларнинг унуб чиққунгача тасмасимон усулда тупроққа пуркалади



ENTOSTOP

Гербицид

Пендиметалин 33%

**Бир йиллик бошоқли ва кенг баргли
бегона ўтларга қарши униб
чиқмасдан олдин қўлланиладиган
юқори самарали гербицид!**



Таъсир этиш хусусияти:

Бир йиллик икки паллали бегона ўтларга қарши ғўза, пиез, картошка, маккажўхори ва сабзида қўлланилганда юқори самара берадиган ажойиб гербициддир. Фақатгина уна бошлаган уруғ ёки майсани эмас, балки 1-2 дона барг чиқарган, препарат таъсирига мойил бўлган бир йиллик икки паллали ўтларнинг майсаларини ҳам нобуд қилади.

Сарф меъёrlари ва қўллаш тартиби

Экин тури	Бегона ўтлар	Сарф меъёри (л/га)	Қўллаш муддати ва усуллари	Мавсумда неча маротаба қўлланиши
Пиезнинг барча авлодлари	Бир йиллик икки паллали	2,3-4,5	Ниҳолларнинг кўкариб чиқишигача тупроққа пуркалади	1
Вўза, маккажўхори, сабзи, картошка		1,0-2,0	Экинларнинг кўкаришигача тасмасимон усулда тупроққа пуркалади	1
Вўза (плёнка остига экилганда)		1	Экиш билан бирга тасмасимон усулда тупроққа пуркалади	1

ENTOGLIFOS

Гербицид

(глифосатнинг калийли тузи 50%)

**Бегона ўтларни ўйқотишда
қўлланиладиган гербицид!**



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат экинларни экиш режалаштирилган майдонларда бир йиллик ва кўп йиллик бошоқли ҳамда икки паллали бегона ўтларга қарши курашда уларнинг фаол ўсув даврида қўлланиладиган гербицид. Бозлар ва узумзорлар, ноқишлоқ хўжалик ерларини бегона ўтлардан тозалаш учун ҳам юқори самара беради.

Сарф меъёрлари ва қўллаш тартиби:

Бир йиллик ва кўп йиллик бошоқли ҳамда икки паллали бегона ўтларга қарши бегона ўтларнинг фаол ўсув даврида гектарига 4,0-5,0 литр ҳисобида мавсумда икки-уч мартаба қўлланилади.



STAPL

Гербицид

(Пиритиобак-натрий 85%)

Ғўза майдонларидаги кенг баргли бегона ўтларга қарши гербицид!



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу гербицид пахта майдонларидаги қўй тикан, дағал каноп, ва бошқа кенг баргли бегона ўтларга қарши самарали таъсир этувчи восита ҳисобланади. Ушбу препарат ғўза ниҳоли 5-8 чинбарг, бегона ўт 2-3 чинбарг чиқарганда қўлланилса самараси юқори бўлади. Препарат қўлланилганда ўсимликда аминокислота ишлаб чиқаришга тўсқинлик қилади, бегона ўтлар илк таъсири 5-10 кунда кўринади. Батамом нобуд бўлиши эса 20-25 кунни ташкил қилади. Гербицидни ғўза ниҳоли кучли чанқоқ ва стресс ҳолатида қўллаш тавсия этилмайди.

Сарф меъёрлари ва қўллаш тартиби

Экин тури	Бегона ўт тури	Сарф меъёри (г/га)	Қўллаш муддати ва усуллари	Мавсумда неча маротаба қўлланилиш
Ғўза	Бир ва кўп йиллик икки паллали бегона ўтлар	70-90+ Агрисол 500 мл	Ғўза 5-8 чин барг чиқарган даврида сирти фаол модда билан қўшиб қўлланади	1

ZELDEK Ekstra

Гербицид

(галооксифоп-Р-метин, 10,4 г/л)

**Ажриқ ва зумайга қарши
қўлланиладиган гербицид!**



Таъсир этиш хусусияти:

Ўйза, пиёз, сабзи, помидор, картошка, нўхат, ерғоқ, лавлаги ва бошқа кенг баргли экинларда, меваги бос, узум бир йиллик ва кўп йиллик бошоқли бегона ўтларга қарши қўлланилади. Бегона ўтлардан қорасули, тулки қуйруқ, қоракурмак, итқўноқ, бешбармоқ, мастак турлари, уруғдан униб чиққан зумай, тўкилган уруғдан унган буғдой ва маккажўхори майсаларига қарши ўйза гуллагунига қадар далаларга ёппасига пуркалади, айниқса, ажриқ ва зумайни юқори даражада назорат қилади.

Сарф меъёрлари ва қўллаш тартиби:

Бир йиллик ва кўп йиллик бошоқли бегона ўтларга қарши гектарига 1,0 - 1,5 литр ҳисобида бегона ўтларнинг бўйи 10-15 см бўлганда пуркалади.



KLETON

Гербицид

(Клетодим 24%)

**Бир йиллик ва кўп йиллик бошоқли
бегона ўтларга қарши самарали
гербицид!**



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат пиёз экинларидаги бир йиллик кенг баргли ва кўп йиллик бошоқли бегона ўтларга қарши қўлланилади. Ноёб фаол моддаси туфайли, уни алмашлаб экишда ишлатишда ҳеч қандай чекловлар йўқ. Яримпарчаланиш даври 1-3 кунни ташкил қилади, бу клетодимнинг ер ости сувларига киришини олдини олади. Қўлланилгандан кейин бир соат ўтиб, ёмғирда ювили кетмайди. Бошқа гербицидлар билан яхши бирикади.

Сарф меъёрлари ва қўллаш тартиби

Экин тури	Бегона ўт тури	Сарф меъёри (л/га)	Қўллаш муддати ва усуллари	Мавсумда неча маротаба қўлланилиш
Пиёз	Кўп йиллик бошоқли бегона ўтлар	0,8-1,0	Бегона ўтлар униб чиқиб 10-15 см бўлганида	1
Ўза	Ажриқ, гумай, камиш	0,8-1,0		

ENTUS

Гербицид

(Римсульфурон 25 %)

**Маккажўхори ва помидор экилган
майдонларда бир йиллик ва қўп
йиллик бошоқли, айрим кенг
баргли бегона ўтларга қарши
қўлланадиган гербицид!**



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат маккажўхори, помидор экинларида бир йиллик ва қўп йиллик бошоқли бегона ўтлардан ва баъзи бир йиллик кенг япроқли бегона ўтларга қарши юқори самарали гербицид. Бегона ўтлардан қорасули, тулки қўйруқ, қоракурмак, итқуноқ, бешбармоқ, мастак турлари, уруздан униб чиққан зумай, кенг баргли бегона ўтлардан эса дагал каноп, эшак шўра, жағ-жағ, чақамиқ, мойчечак ялпиз, лологизвалдоқ, ёввойи туруп, Аччиқ ўт, юлдузўтга юқори даражада назорат қилади. Нам ва иссиқ хароратда яхши самара беради.

Сарф меъёрлари ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Бегона ўтлар	Сарф-меъёр (г/га)	Қўллаш муддати ва усуллари	
			Экиннинг ўсув даври	Бегона ўтларнинг ўсув даври
Маккажўхори	Бир йиллик ва қўп йиллик бошоқли ва баъзи бир йиллик кенг баргли бегона ўтлар	50-60+СФМ энто 90 ёки силвер 200мл	Маккажўхори 3-5 барг чиқарганда	Бегона ўтларнинг бўйи 10-15 см бўлганда пуркалади
Помидор	Бир йиллик ва қўп йиллик бошоқли ва баъзи бир йиллик кенг баргли бегона ўтлар	40-50+СФМ энто 90 ёки силвер 200мл	Помидор 3-5 барг чиқарганда	Бегона ўтларнинг бўйи 10-15 см бўлганда пуркалади



GERBIS PRO

Гербицид

**(Форамсульфурон 30%
йодосульфурон-метил натрий 1%
антидот изоксадифен этил 30%)**

Маккажўхори экинларида бир ва кўп йиллик бошоқли ҳамда икки паллали бегона ўтларга қарши кенг спектрли гербицид!



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат маккажўхори экинларидаги бир ва кўп йиллик бошоқли ҳамда икки паллали бегона ўтларни йўқ қилишда самарали гербицид бўлиб, барг ва қисман илдиз тизими орқали тез сўрилади, бутун ўсимлик бўйлаб озуқа оқимларининг пасайиши ва кўтарилиши баробарида ҳаракат қилади. Препарат таркибидаги моддалар ўсиш нуқталарида ва шу жумладан куртакларда тўпланади. Бегона ўтларнинг ўсиши гербицид қўллангандан сўнг дарҳол тўхтайдۇ (1-2 соат). 4-10 кундан кейин барглар сарғаяди, қизил довлар пайдо бўлади, улар прогрессив қора довларга айланади ва бегона ўтларнинг тўлиқ қуриб нобуд бўлиши 10-20 кун оралиғида кузатилади. Гербицид таъсири тезлиги бегона ўтларнинг турига ва ҳаво ҳарорати шароитига боғлиқ.

Сарф меъёrlари ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Бегона ўтлар	Сарф меъёри (л/га)	Қўллаш муддати ва усуллари	Мавсумда неча маротаба қўлланиши
Маккажўхори	Бир ва кўп йиллик бошоқли ва икки паллали бегона ўтлар	0,125-0,15 + 1 л Био Пауэр	Экиннинг 3-5 баргли фазасида пуркалади	1

KORNET Ekstra

Гербицид

**(Мезотрион 37,5 г/л
Никосульфурон 15 г/л)**

**Маккажўхоридаги бир йиллик ва
айрим кўп йиллик паллали ва
бошоқли бегона ўтларга қарши
самарали гербицид!**



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу гербицид маккажўхори экинларидаги бир ва кўп йиллик бошоқли ва икки паллали бегона ўтларга қарши курашда ишлатиладиган самарали гербицид. Препарат қўллангандан бир икки кун ўтиб бегона ўтлар ўсиш ва ривожланишдан тўхтайдۇ. Шу билан бирга бегона ўтларнинг япроғидан сўрилиб, то илдизгача қуришига олиб келади.

Сарф меъёрлари ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Бегона ўт тури	Сарф меъёри (л/га)	Қўллаш муддати ва усуллари	Мавсумда неча маротаба қўлланилиши
Маккажўхори	Бир йиллик ва айрим кўп йиллик икки паллали ҳамда бошоқли бегона ўтлар	3,0-4,0	Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади	1



OKSIGOL

Гербицид

(Оксифлуорфен 24 %)

**Кенг баргли бегона ўтларга
қарши қўлланиладиган гербицид!**



Таъсир этиш хусусияти:

Пиёз ва саримсоқпиёз экилган майдонларда бир йиллик кенг баргли бегона ўтларнинг бошланғич ўсув даврида қўлланиладиган селектив гербицид. Жағ-жағ, Сассиқоя, Қуртэна, Салатўт, Чумчуқтили, Мойчечак, Ёввойи турп, Аччиқўт, Юлдузўт, Тиласпи, Олабўта, Қизилтасма, Бангидевона, Исмамоқ ва бошқа бегона ўтларни йўқотишда юқори самара беради.

Сарф меъёрлари ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Бегона ўтлар	Сарф меъёр (л/га)	Қўллаш муддати ва усуллари	
			Экиннинг ўсув даври	Бегона ўтларнинг ўсув даври
Пиёз	Бир йиллик икки паллали бегона ўтлар	0,5-1,0	Пиёз 2-4 барг чиқарганда пуркалади	Униб чиққандан сўнг. Бегона ўтлар ривожланишининг бошланғич даврида қўлланилса, яхши самара беради

FASTER

Гербицид

(Квинклорак 25 %)

**Курмакни йўқотишда
қўлланиладиган гербицид!**



Таъсир этиш хусусияти:

Препарат шолининг фаол ўсув даврида бир йиллик бошоқли (тариқсимон) бегона ўтларга қарши курашда қўлланилади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Бегона ўтлар	Сарф меъёри (л/га)	Қўллаш муддати ва усуллари	
			Экиннинг ўсув даври	Бегона ўтларнинг ўсув даври
Шоли	Бир йиллик бошоқли (тариқсимон) бегона ўтлар	2,0-3,0	Шоли униб чиққандан сўнг 2-3 барглик даврида	Бегона ўтларнинг фаол ўсув даврида, яъни 3-4 барг ёки уларнинг бўйи 5-10 см бўлганида



FASTER ALFA

Гербицид

(Квинклорак 47% +
пиразосульфурон-этил 3%)



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат шולי экилган майдонлардаги бир йиллик бошокли (тариқсимон) ва ҳилол бегона ўтларига қарши тизимли таъсир этувчи восита. Препаратни шолини унуб чиқиши ва туплаш даврида, бегона ўтларнинг эса илк ривожланиш фазасида қўлланса, юқори самарадорликка эришилади. Препаратни албатта сирти фаол модда билан қўшиб қўллаш лозим.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Бегона ўтлар	Сарф меъёри (л/га)	Қўллаш муддати ва усуллари	
Шоли	Бир йиллик бошокли (тариқсимон) бегона ўтлар	0,8-1,0 + сирт фаол модда	Шоли униб чиққандан сўнг 2-3 барглик даврида	Бегона ўтларнинг фаол ўсув даврида, яъни 3-4 барг ёки уларнинг бўйи 5-10 см бўлганида

BENTOGRAN

Гербицид

(Бентозан 48%)

Сув ҳилолга қарши самарали гербицид!



Таъсир этиш хусусияти:

Ғалла, маккажўхори, беда ва шолининг фаол ўсув даврида бир йиллик кенг баргли ва кўп йиллик бошоқли (сув ҳилол) бегона ўтларни йўқотишда қўлланилади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Бегона ўтлар	Сарф меъёри (л/га)	Қўллаш муддати ва усуллари	
			Экиннинг ўсув даври	Бегона ўтларнинг ўсув даври
Шоли	Бир йиллик икки паллали бегона ўтлар, кўп йиллик бошоқли илдиз пояи (сув ҳилол) бегона ўтлар	2-4	Шоли униб чиққандан сўнг 2 баргли тупланиш даврида	Бегона ўтларнинг 2-5 барг фаол ўсув даврида, сув сатхи 0-2 см бўлганида



LANDASK

Гербицид

(Бенсулфурон-метил 60%)

**Шолидаги ҳилол бегона ўтига
қарши самарали гербицид!**



Таъсир этиш хусусияти:

Шолидаги ҳилолга қарши қўлланиладиган системали (ичидан таъсир этувчи) гербицид. Препарат шолнинг туллаш даврида, бегона ўтларнинг илк ривожланиш фазасида қўлланилади. Препаратнинг илк самараси қўлланилгандан 5-7 кун ўтиб кўрина бошлайди, бегона ўтларнинг тўлиқ nobуд бўлиши 10-15 кунда кузатилади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Сарф-меъёри (г/га)	Бегона ўт тури	Қўллаш муддати ва усули
Шоли	80-100	Ҳилол	Ўсимликнинг туллаш даврида пуркалади

SURIS

Гербицид

(Пирazosулфурон-этил 10%)

**Ҳилол бегона ўтига қарши
самарали гербицид!**



Таъсир этиш хусусияти:

Шолидаги ҳилолга қарши қўлланиладиган системали (ичидан таъсир этувчи) гербицид бўлиб, шолининг туғлаш даврида, бегона ўтларнинг илк ривожланиш фазасида қўлланилади. Препаратнинг илк самараси қўлланилгандан 5-7 кун ўтиб кўрина бошлайди, бегона ўтларнинг тўлиқ nobуд бўлиши 10-15 кунда кузатилади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Сарф-меъёри (кг/га)	Бегона ўт тури	Қўллаш муддати ва усули
Шоли	0,2-0,3	Ҳилол	Препарат шолининг туғлаш даврида (4-6 барг чиқарганда), бегона ўтларнинг илк ривожланиш фазасида (5-7 барг бўлганида) пуркалади



YOKOZUNA

Гербицид

(Бензобуциклон 50 %)

Шолидаги бир ва қўп йиллик бошоқли ҳамда кенг баргли бегона ўтларга қарши қўлланиладиган гербицид!



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат шолидаги бир ва қўп йиллик бошоқли ҳамда айрим кенг баргли бегона ўтларга қарши ишлатилади. Препаратни шоли экишдан аввал ёки ниҳол униб чиқмасидан олдин қўллаш лозим. Гербицид қўллангандан даврда экин майдон 10-12 см сув билан қопланиб, камида 5 кун мунтазам сувни ушлаб туриш мақсадга мувофиқ. Шу билан бирга ушбу майдонда бошқа агротехник тадбирларни тўхтатиб туриш лозим. Препаратни қўл аппарати орқали қўлланганда препарат қамраб олган майдон чегараси оралиғи 20-30 метрдан ошмаслигига эътибор бериш керак.

Сарф меъёрлари ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Бегона ўтлар	Сарф меъёри (л/га)	Қўллаш муддати ва усуллари	Мавсумда неча маротаба қўлланилиши
Шоли	Ҳилол, қурмак ва бошқа бошоқли ҳамда айрим кенг баргли бегона ўтлар	0,5-0,6	Экишдан аввал ёки унуб чиқмасдан олдин	1



DALATE

Инсектоакарицид

(Лямбдацигалотрин 5%)

*Сўрувчи ва кемирувчи
зараркунандаларга қарши
самарали восита!*



Таъсир этиш хусусияти:

Барча ўсимликларда сўрувчи ва кемирувчи зараркунандалар ҳамда каналарга қарши инсектоакарицид. Зарарли хасва, ширалар, трипс, ўргимчаккана, оққанот, баргўрар қуртлар, каналар, дон қўнғизлари, чигирткалар, тут парвонаси, шиллиққурт, визилдоқ қўнғиз, фитономус, қовун пашшаси, узумбаргўрар қуртлари, мевахурлар, олма қурти ва бошқа зараркунандаларни йўқотишда қўлланилади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Сўрувчи ва кемирувчи зараркунандалар ҳамда каналарга қарши зараркунанданинг турига қараб гектарига 0,15-0,5 литр ҳисобида ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади.



DALATE Plus

Инсектоакарицид

(Лямбдацигалотрин 10%)

*Сўрувчи ва кемирувчи
зараркунандаларга қарши
самарали восита!*



Таъсир этиш хусусияти:

Сўрувчи ва кемирувчи ҳашаротлар ҳамда каналарга қарши инсектоакарицид. Ширалар, трипс, ўргимчаккана, оққанот, баргўрар қуртлар, каналар, дон қўнғизлари, зарарли хасва, чигирткалар, тут парвонаси, шиллиққурт, визилдоқ қўнғиз, фитономус, қовун пашшаси, узум баргўрар қуртлари, мева-хўрлар, олма қурти ва бошқа зараркунандаларга қарши қўлланилади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Зараркунандалар	Сарф-меъёр (л/га)	Қўллаш муддати ва усуллари
Фалла	Дон қўнғизлари, трипс, зарарли хасва, шира ва шилиққурт (пявица)	0,07-0,15	Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади
Мевали боғлар	Шира, трипс, қалқондорлар	0,2-0,4	

EKVADOR

Инсектицид

(Имидаклоприд 35%)

**Шира, трипс ва бошқа
зараркунандаларга қарши
тизимли таъсир этувчи восита!**



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат шира, трипс, қандалалар, хасва, тут парвонаси, визилдок қўнғиз, зовакловчи пашша, қалқондорлар, мевахўрлар, баргурар қуртлар, чигирткасимонлар ва бошқа зараркунандаларга қарши қўлланиладиган тимизли таъсир этувчи восита ҳисобланади. Препаратнинг ҳимоя таъсири даври об-ҳаво шароитидан келиб чиқиб, 10-14 кунни ташкил этади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Зараркунандалар	Сарф меъёри (л/га)	Қўллаш муддати ва усули	Мавсумда неча маротаба қўлланилиши
Вза	Шира, трипс, қандалалар	0,2	Всимликнинг ўсув даврида	2
Ғалла	Шира, трипс, хасва, визилдок қўнғиз	0,15-0,2		
Боғ сабзавот	Шира, трипс	0,2		



RIMIDA

Инсектицид

(Имидаклоприд 70%)

**Зараркунандаларга қарши
уруғлик чигитни дорилашда
қўлланиладиган юқори самарали
ичдан таъсир этувчи
инсектицид!**



Таъсир этиш хусусияти:

Зараркунандаларга юқори самарали текканда ва ичдан зараркунанда озиқланиши натижасида меъда-ичак орқали таъсир этувчи инсектициддир. Шира, трипс, узунтумшук ва оққанотга қарши уруғлик чигитни дорилашда юқори самарали инсектицид. Зараркунандаларнинг марказий нерв тизимини фалаж қилиб, озиқланишдан қолдиради ва ўлим ҳолатига олиб келади. Узоқ муддат давомида ўз таъсир кучини сақлаб қолади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Зараркунандалар	Сарф-меъёр (кг/га)	Қўллаш муддати ва усуллари
Ўза	Шира, трипс, узунтумшук, оққанот	4-5 кг/1 тонна чигит	Уруғлик препарат эритмасида дориланади (1 тонна уруққа 15-25 литр сув)
Ўза	Шира, трипс қанда	0,1	Ўсимликнинг ўсув даврида
Ғалла	Шира трипс		
Боғ сабзавот	Шира трипс		

ENTOSPILAN

Инсектицид

(Ацетамиприд 20%)

*Зараркунанда ҳашаротларга
қарши самарали восита!*



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат ғўза ва бошқа экинлардаги шира, трипс, колорадо қўнғизи, тут парвонаси ва бошқа зараркунандаларга қарши курашда қўлланилади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Зараркунандалар	Сарф меъёри (кг/га)	Қўллаш муддати ва усуллари
Ғўза	Шира, трипс кандала	0,15-0,3	Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади
Тут	Тут парвонаси	0,15-0,3	
Боғ ва узумзорлар	Шира, трипс	0,15-0,3	
Ғалла	Шира, трипс	0,2-0,3	



AGROFOS-D

Инсектоакарицид

**(циперметрин 5% +
хлорпирифос 50%)**

**Зараркунандаларга қарши
самарали восита!**



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат олма қурти, цикадалар, шира, трипс, зарарли хасва, шиллиққурт, олма қурти, баргўрар қуртлар, ўргимчаккана, ғовакловчи пашша, намот канаси, қуялар, тут парвонаси ва бошқа бир қатор зараркунандаларни йўқотишда юқори самарали инсектоакарицид.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Зараркунандалар ва экиннинг турига қараб гектарига 0,5-1,5 литр ҳисобида ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади.



AGROFOS EKSTRA

Инсектоакарицид

**(циперметрин 10%
хлорпирифос 50%)**

**Зараркундаларга қарши
самарали восита!**



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат цикадалар, шира, трипс, зарарли хасва, шиллиққурт, олма қурти, баргўрар қуртлар, ўргимчаккана, зовакловчи пашша, намот канаси, куялар, тут парвонаси, ва бошқа бир қатор зараркундаларга қарши юқори самарали инсектоакарицид.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Зараркунандалар	Сарф меъёри (л/га)	Қўллаш муддати
Вўза	Шира, ўргимчаккана, трипс	0,5-0,8	Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади
Бугдой	Шира, трипс, зарарли хасва	0,2-0,5	
Боғ ва узумзор	Ўргимчаккана, қалқондор, олма мевахўри		



MERGAN

Инсектицид

(Дифлубензурон 6%)

**Чигирткасимонларга қарши
самарали восита!**



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат қўлланган майдонларда зараркундаларнинг озиқланишига тўсқинлик қилади ва ривожланишини тўхтатади. Шу билан бирга зараркундаларнинг ўсимликларга қўйган тухумларига зарарли таъсир қилади. Препарат таъсир қилган тухумлардан личинкалар чиқмайди. Препаратнинг эътиборли жихати фойдали ҳашаротлар, йиртқич каналар ва асалариларга салбий таъсир кўрсатмайди. Препаратнинг илк самараси қўллангандан кейин 3-5 кунда, максимал нобуд бўлиши 10-12 кунни ташкил қилади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Зараркундалар	Сарф меъёр (л/га)	Қўллаш муддати ва усуллари	Мавсумда неча маротаба қўлланилиши
Яйлов экинлари	Чигирткасимонлар	0,25	Ҳашарот тарқалган майдонларга ёппасига ёки тўсик усулида пуркалади	1

ENTOMIN

Инсектоакарицид

(Нефт мойлари 80%)

Зараркунандаларга қарши кенг спектрли восита!



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат кенг қўламда қўлланилганда зараркунандаларга таъсир этиш хусусияти энг самарали инсектоакарицидлардан бири ҳисобланиб, мевали боғлардаги қишлоғчи зараркунандалар ва уларнинг кейинги авлодларига қарши самарали таъсир қилади. Препарат таркибидаги парафин мойи қўлланган ўсимлик юзаси бўйлаб тенг ёйилади ва зараркунанданинг нафас йўллариغا киради ҳамда нафас йўлини беркитади. Препарат мевали боғ, тоқзор ҳамда манзарали дарахтларда учрайдиган қалқондорлар, сохта қалқондорлар, нок ширинчаси, комсток қурти, қон бити ва шунга ўхшаш зирхли зараркунандаларга қарши қўлланилганда тухуми ёки танасидаги моддалар ва ҳаво алмашинувни тўхтатиб, мустаҳкам қобиқ ҳосил қилади. Шу тариқа зараркунандалар бўғилиб, нобуд бўлишига олиб келади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Зараркунандалар	Сарф меъёри (л/га)	Қўллаш муддати ва усули	Мавсумда неча маротаба
Олма, нок, манзарали экинлар	Қалқондорлар, нок ширинчаси, комсток қурти, қон бити	10,0-15,0	Тиним даврида пуркаш орқали	1



DEMOFOS

Инсектоакарицид

(Диметоат 40%)

***Зараркунандаларга қарши
самарали восита!***



Таъсир этиш хусусияти:

Таъсир доираси зараркунандалар учун жуда кенг: экинлардаги ширалар, каналар, мевахўрлар, баргхўр куртлар, қўнғизлар, ширинчалар, баргўрар куртлар, қуялар, қалқондорлар, сохта қалқондорлар, хасва, шиллиққурт унсимон куртлар, баргўрар куртлар, ғалла пашшалари, трипслар, оққанот, ғовакловчи пашша, ғовакловчи қуя ва бошқа бир неча турли зараркунандаларни йўқотишда самарали восита.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Зараркунандалар ва экиннинг турига қараб гектарида 0,5-2,5 литр ҳисобида ўсимликнинг ўсув даврида мавсумда 1-2 мартаба қўлланилади.

ENTOMETRIN

Инсектицид

(Циперметрин 25%)

*Зараркунанда ҳашаротларга
қарши самарали восита!*



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препаратнинг таъсир қилиш доираси ҳашаротлар учун жуда кенг. Зараркунандалардан шира, трипс, оққанот, илдизқирқар тунламлар, қандалалартут парвонаси, шиллиққурт, хасва, баргўрар қуртлар, мевахўрлар, фитономус, оқ-капалак, куя, чигирткасимон ва бошқа зараркунандаларни йўқотишда қўлланилади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Зараркунандалар ва экиннинг турига қараб гектарига 0,15-0,35 литр ҳисобида ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади.



DELTA SIS

Инсектицид

(Дельтаметрин 2,5%)

**Колорадо қўнғизи ва бошқа
зараркунанда ҳашаротларга
қарши самарали восита!**



Таъсир этиш хусусияти:

Экинлардаги пашшалар, қўнғизлар, шира, трипс, тунламлар, оққанот, қандалалар, тут парвонаси, макка парвонаси, шиллиққурт, хасва, баргўрар қуртлар, мевахўрлар, фитонемус, оқ капалак, куя, чигирткасимонлар ва бошқа зараркунандаларни йўқотишда юқори самарали инсектицид.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Зараркунандалар	Сарф меъёри (л/га)
Картошка	Колорадо қўнғизи	0,1-0,15
Олма	Шира, барг ўрар қуртлар, олма қурти	0,5-1,0
Помидор	Ширалар, трипс, тунламлар	0,25-0,5
Ўғза	Илдиз қурти	0,25-0,5

ENTOMEKTIN

Инсектоакарицид

(Абамектин 1,8%)

Шира, трипс ва ўргимчакканага қарши қўлланиладиган восита!



Таъсир этиш хусусияти:

Каналар ва барг зовакловчи зараркунандаларга қарши системали таъсир этувчи юқори самарали инсекто - акарицид. Ғўза ва бошқа экинлардаги ўргимчаккана, шира, трипс қарши қўлланилади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Зараркунандалар	Сарф меъёри (л/га)	Қўллаш муддати
Ғўза	Ўргимчаккана	0,3 - 0,5	Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади
	Шира, трипс		
Мевали боғлар	Ўргимчаккана, шира, трипс	0,3-0,5	



ENTOMEKTIN Ekstra

Инсектоакарицид

(Абамектин 3,6%)

*Шира, трипс ва ўргимчакканага
қарши қўлланиладиган восита!*



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат каналар ва барг зовакловчи зараркунандаларга қарши тизимли таъсир этувчи юқори самарали инсектоакарицид. Ўсимликка максимал тезликда сўрилади ва зараркунандаларни қийин кириб борадиган мухитда ҳам нобуд қилади. Қўлланган махсулотнинг таркибида тўпланиб қолмайди. Ғўза, бов-ток ва сабзавот-полиз экинларидаги ўргимчаккана, шира, трипс, кўсак қуртининг майда ёшдагусига қарши қўлланилади. Аксарият пестицидлар билан мослашади ва препаратнинг ишлаш самарадорлигини оширишга ёрдам беради.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Зараркунандалар	Сарф меъёри (л/га)	Қўллаш муддати
Ғўза	Шира, трипс, ўргимчаккана	0,2 - 0,3	Ўсимликнинг ўсув даврида
Сабзавот полиз	Шира, трипс, каналар	0,15	

ENTOSORAN

Акарицид

(Гекситиазокс 10%)

*Ўргамчакканага қарши
самарали восита!*



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат каналарга қарши самарали акарицид. Каналарнинг тухум, личинка ва нимфаларини йўқ қилади, катта ёшдаги каналарнинг эса кўпайиш қобилиятини йўқотади. Узоқ муддат ўз таъсир кучини сақлаб қрлади (50 кунгача).

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Зараркундалар	Сарф меъёри (кг/га)	Қўллаш муддати ва усуллари
Ўйза	Ўргамчаккана	0,2-0,3	Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади
Олма, гилос боғлар	Каналар	0,3	



SPIROMEKTIN

Акарицид

**(Спиродиклофен 22,2%
абамектин 1,8%)**

**Ўсимликхўр каналарга
қарши самарали восита!**



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат ёўза, олма ва бошқа экинлардаги ўсимликхўр каналарнинг барча ривожланиш босқичларига (тухум, личинка ва етук-имаго) қарши самарали таъсир этувчи акарицид.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Зараркунандалар	Сарф меъёри (л/га)	Қўллаш муддати ва усуллари
Ёўза	Ўргамчаккана	0,25	Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади
Олма, гилос	Каналарга		



AKARAGOLD

Акарицид

**(Пропаргит 66%
гекситиозокс 6%)**

**Ўсимликхўр каналарга қарши
самарали восита!**



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат каналарга қарши юқори самарали препарат сифатида эътироф этилган, боғларда ва дала экинларида барча ҳаракатчан фазаларидаги каналарга (личинка, нимфа ва етук зот)га қарши юқори самарали.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Зараркунандалар	Сарф меъёри (л/га)	Қўллаш муддати ва усуллари
Ғўза	Ўргамчаккана	0,3-0,5	Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади
Боғ ва узумзорлар			



ENTOMAYT

Акарицид

(Пропаргит 57%)

*Сўрувчи зараркунандаларга
қарши самарали акарицид!*



Таъсир этиш хусусияти:

Взани зараркунандалардан уйғунлашган усулда химоя қилиш дастурига киритилган акарицид. Боғларда ва дала экинларида каналарнинг барча ҳаракатчан фазалари (личинка, нимфа ва етук зот)га қарши юқори самарали.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Зараркунандалар	Сарф меъёри (л/га)	Қўллаш муддати ва усуллари	Мавсумда неча мартаба қўлланиши
Вза	Вграмчаккана	1,5	Всимликнинг ўсув даврида пуркалади	2
Боғ ва узумзорлар				



ENTOVANT

Инсектицид

(Индоксикарб 15%)

*Кўсак қуртига қарши самарали
восита!*



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат аўза тунлами (кўсак қурти), тут парвардаси, шингил баргўрари ва олма мевахўрига қарши самарали инсектицид.

Бир вақтнинг ўзида зараркунанда капалакларининг тухумлари ва уларнинг қуртлари билан бир хил курашади. Қуртларнинг ҳамма турдаги ёшларига таъсир қилади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Зараркунандалар ва экиннинг турига қараб гектарига 0,5-0,6 литр ҳисобида ўсимликнинг ўсув даврида қўлланилади.



PROMAYT

Акарицид

(Пиритабен 20%)

**Ўғзадаги ўргимчакканага қарши
самарали восита!**



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат ўргимчаккананинг барча ривожланиш босқичларида самарали таъсир қиладиган текканда таъсир этувчи акарицид. Препарат экинларга қўлланганда тез ва узоқ муддатли таъсирга эга бўлиб, мевали боғларда иқлим шароитига қараб, мавсум давомида атиги 1 марта қўлланилади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Зараркунандалар	Сарф меъёри (кг/га)	Қўллаш муддати ва усуллари	Ҳосил йиғимига қанча қолганда ишлов тўхтатилади (кун)	Мавсумда неча мартаба қўлланилиши
Ўғза	Ўргимчаккана	1,0-1,5	Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади	30	2



EZOTOKS

Акарицид

(Этоксазол 10%)

**Каналарга қарши қўлланиладиган
самарали акарицид!**



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат қишлоқ хўжалиги экинларига зарар келтирадиган каналарга қарши самарали акарицид. Каналарнинг личинка ҳамда нимфаларини йуқ қилади. Етук ёшдаги каналарни эса кўпайиш қобилятини пасайтириб, нобуд бўлишига олиб келади. Препарат узоқ муддат ўз таъсир кучини сақлаб қолади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Зараркунандалар	Сарф меъёри (л/га)	Қўллаш муддати ва усуллари	Мавсумда неча маротаба қўлланилиши
Ўза	Ўргамчаккана	0,3-0,4	Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади	2
Бошқа экинлар	Каналар	0,3-0,4	Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади	2



INDOKSAMEKTIN

Инсектоакарицид

**(Индоксакарб 7,5%
Абамектин 1,8%)**

***Тута абсолютта ва бошқа
зараркунандаларга
қўлланиладиган самарали
восита!***



Таъсир этиш хусусияти:

Ғўзадаги кўсак қурти, олмадаги олма қурти ва очиқ қамда ёпиқ майдонларда тарқалган Тута абсолютта зараркунандаларини йўқ қилишда юқори самара берадиган препаратдир.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Зараркунандалар	Сарф меъёри (л/га)	Қўллаш муддати
Ғўза	Ғўза тунлами (кўсак қурти)	0,45-0,7	Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади
Олма	Олма қурти, филофли куя		
Ток	Барг ўровчи қуртлар		
Помидор	Помидор куяси (тутаабслюта)		

EVISECT

Инсектицид

(Тиаметооксам 35 %)

Помидор куяси (Тутаабсолют) ва оққанотга қарши текканда таъсир этувчи восита!



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат трипс, оққанот ва куяларга қарши қўлланилганида текканда таъсир этувчи хусусиятига эга самарали восита. Препарат қўлланганда тавсия этилган зараркунандага нисбатан қисқа муддатда таъсир қилади. Препаратнинг эътиборли жихати шундаки, такрор қўлланганда ҳам зараркунандаларда препаратга нисбатан мослашувчанглик ҳосил қилмайди ва самарали таъсир қилади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Зараркунандалар	Сарф меъёри (кг/га)	Қўллаш муддати ва усуллари	Ҳосил йиғимида қанча қолганда ишлов тўхтатилади (кун)	Мавсумда неча мартаба қўлланилиши
Пийёз	Трипс, оққанот	0,45-0,6	Ўсимликнинг ўсув даврида	30	2-3
Помидор	Помидор куяси (тутаабсолют), оққанот				



PROTEKT

Инсектицид

(Эмамектинбензоат 5%)

Кўсак қуртига қарши самарали восита!



Таъсир этиш хусусияти:

Гўза, помидор, боғ, ток ва сабзавот экинларига зарар келтирувчи кемирувчи қуртларга, жумладан, гўза тунлами, олма қурти, гилофли куя каби зараркунандаларга қарши юқори самарали инсектицид. Юқори ҳароратларда ҳам самарасини пасайтирмайди ва 15 кунгача таъсир кучини сақлаб қолади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Зараркунандалар	Сарф меъёри (кг/га)	Қўллаш муддати ва усуллари
Гўза	Гўза тунлами	0,5	Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади
Олма	Олма қурти, гилофли куя	0,45-0,5	
Сабзавот экинлари	Карам қурти	0,5	

PROTEKT PRO

Инсектицид

**(Эмамектин бензоат 5%
индоксакарб 10%)**

**Кемирувчи зараркунандаларга
қарши қўлланиладиган самарали
инсектицид!**



Таъсир этиш хусусияти:

Ғўза, тут, ток, олма, иссиқхона ва сабзавот экинларидаги сўрувчи ва кемирувчи зараркунандаларга қарши текканда ва ичдан таъсир этувчи юқори самарали инсектицид. Бошқа препаратларга чидамли бўлган зараркунандаларга, айниқса, кўсак қуртига қарши курашда самарали қўлланилади. Препарат таркиби икки хил таъсир этувчи моддадан иборат эканлиги препарат самарадорлиги юқори бўлишини таъминлаб беради. Зараркунандаларнинг барча ривожланиш босқичларида ҳам самарали таъсир қилади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Сарфлаш меъёри (л/га)	Зараркунандалар тури	Қўллаш муддати ва усули
Ғўза	0,4-0,5	Ғўза тунлами	Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади
Боғ ва узумзорлар	0,3-0,45	Олма қурти, комсток қурти, шарқ мевахўри	



ENTOVANT PRO

Инсектицид

(Индоксакарб 30%)

**Кўсак қуртига қарши самарали
восита!**



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат ёўза тунлами (кўсак қурти), тут парвонаси, шингил барг ўрарлари ва олма мевахўрига қарши самарали инсектицид бўлиб, бир вақтни ўзида зараркунанда капалаklarининг тухумлари ва уларнинг қуртлари билан бир хил курашади. Кемирувчи қуртларнинг ҳамма ёшдагиларига таъсир қилади. Препарат зараркунанданинг тури, атроф-муҳит шарт-шароитлари ва сарф меъёрларига бовлиқ холда 14 кунгача таъсир кучини сақлаб қолади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Зараркунанда р	Сарф меъёри (кг/га)	Қўллаш муддати ва усуллари	Мавсум давомида неча маротаба қўлланиши
Ёўза	Қўзги тунлам (илдиз қурти)	0,2-0,25	Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади	2-3
Очиқ ва ёпиқ грунтдаги помидор	Ёўза тунлами, помидор қуяси			
Боғ	Шарқ мевахўри, олма мевахўри	0,25		



ENTOLUCHO

Инсектицид

(Имидаклоприд 20%)

**Шира, трипс ва бошқа
ҳашаротларга қарши самарали
восита!**



Таъсир этиш хусусияти:

Колорадо қўнғизи, шира, трипс, қандалалар, тут парвонаси, визилдоқ қўнғиз, зовакловчи пашша, қалқондорлар, мевахўрлар, баргўрар қуртлар, тунламлар, чигирткасимонлар, симқуртлар ва бошқа зараркунандаларга қарши қўлланиладиган системали инсектицид.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Зараркунандалар ва экиннинг турига қараб гектарида 0,15-0,3 литр ҳисобида ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади.



ENTOVET

Инсектицид

(Тиаклоприд 24%)

**Каналар ва зараркундаларга
қарши қўлланиладиган юқори
самарали инсектоакарицид!**



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат олма, узум ва бошқа қишлоқ ҳўжалиги экинларидаги сўрувчи ва кемурувчи зараркундаларга қарши қўлланиладиган инсектицид. Зараркундалар сиртдан ва ичдан (ўсимлик танасига шимилиб сингиши натижасида системали) таъсир этиш хусусиятига эга.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Зараркундалар	Сарф меъёри (л/га)	Қўллаш муддати ва усуллари	Мавсумда нечи мартаба қўлланиши
Олма	Олма мевахўри, баргўрар куртлар, қалқондорлар, олма гулхўри	0,3 - 0,4	Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади	2
Узум	Шингил баргўрари	0,2 - 0,4		

EZOFOKS

Инсектицид

(Ацефат 75%)

Ғўзадаги шира ва трипсга қарши ҳам уруғлик чигитни дорилашда, ҳам ўсув даврида қўлланиладиган текканда ва ичдан таъсир этувчи инсектицид!



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат зараркунандаларга текканда ва ичдан таъсир этувчи фосфорорганик инсектицид. Препарат очиқ далада ва иссиқхоналарда сабзавот экинлари (картошка, сабзи, помидор ва бошқалар), ғўза ва боғлардаги сўрувчи зараркунандаларга қарши ўсимликларнинг ўсув даврида қўлланилади. Шунингдек, ғўзадаги шира ва трипс каби зараркунандаларга қарши уруғлик чигитни дорилаш орқали курашда ҳам қўлланилади. Ичдан таъсирга эга бўлганлиги сабабли, препарат шира, трипс ва оқ пашиаларга қарши курашда самарали қўлланилади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Зараркунандалар	Сарф меъёр (кг/га)	Қўллаш муддати ва усуллари
Ғўза	Шира, трипс, қандала	0,75	Экинларнинг ўсув даврида пуркалади
Ғўза	Шира, трипс	4,0 кг/тонна чигит	Уруғлик препарат эритмасида дориланади (1 тонна уруққа 15-25 литр сув
Пиёз	Шира, трипс	0,7-1,0	



TAKSAM

Инсектицид

(Туаметоксам 35 %)

**Зараркунандаларга қарши
текканда ва тизимли таъсир
этувчи восита!**



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат шира, трипс, зарарли хасва, колорадо кунгузи, симқуртлар, оққанот, кўсак қурти, илдиз қурти зараркунандаларига қарши қўлланилганида ўсимлик томонидан трансламинар фаоллик билан сўрилиб, системали ва контакт таъсир қилиш хусусиятига эга самарали восита. Препарат қўлланганда ўсимликка тез фурсатда сингийди ва ҳашаротларнинг асаб тизимида таъсир қилади. Препарат баргдан қўлланилганда зараркунандаларга қарши таъсир давомийлиги 15-20 кун, тупроққа қўлланганда 30-40 кунни ташкил этади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Зараркунандалар	Сарф меъёри (л/га)	Қўллаш муддати ва усуллари	Ҳосил йиғимида қанча қолганда ишлов тўхтатилади (кун)	Мавсумда неча мартаба қўлланилиши
Ўза	Шира, трипс, кандалалар, илдиз қурти	0,8	Ўсимликнинг ўсув даврида	30	2
Помидор	Шира, трипс, оққанот				1
Олма	Олма мевахўри, баргўрар қуртлар	0,3-0,8			2

MILITAR

Инсектицид

(Пирипроксифен 10%)

**Бог ва сабзавот экинларидаги
оққанот ҳамда қалқондорларга
қарши юқори самарали восита!**



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат олмадаги олма қурти ва бинафшаранг қалқондор, бодринг, помидор ва аўза майдонларидаги оққанот зараркунандаларига қарши самарали таъсир қилувчи восита ҳисобланади. Экинга тавсия этилган меъёрда қўлланганда зараркунандаларнинг имагоси стерилизация қилади ва личинкалар пайдо бўлишини олдини олади. Мавжуд личинкаларнинг ривожланишини кейинги босқичига ўтиш жараёнларини бузади, бу эса зараркунандаларнинг тўлақонли нобуд бўлишига олиб келади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Зараркунандалар	Сарф меъёри (л/га)	Қўллаш муддати ва усуллари	Ҳосил йиғимида қанча қолганда ишлов тўхтатилади (кун)	Мавсумда неча маротаба қўлланилиши
Ўза	Оққанот	0,5	Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади	30	2
Помидор, Бодринг	Оққанот				1
Олма	Қалқондорлар				1



IN-TO

Инсектоакарицид

(Спиротетрамат 10%)

Иссиқхонадаги оққанот, шира, трипс ва ўргимчакканага қарши юқори самарали инсектицид!



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат ўсимлик хужайрасига тез сингиб, ўсимликнинг илдиздан то ўсув нуқтасигача ҳаракатланади. Шунингдек флоэма бўйлаб базипетал ва акропетал равишда ҳаракатланади, илдиз тизимини тупроқ ости зараркунандаларидан ишончли ҳимоясини, шунингдек янги барглари ўсишини кафолатлайди. Помидордаги оққанот, шира ва трипс шу билан бирга олмадаги қалқондор каби зараркунандаларга қарши қўлланилади. Препарат ўсимликка сингигач, зараркунанда озиқланишдан тўхтайдиган ва авлод қолдириш цикли бузилиб, нобуд бўлади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Зараркунандалар	Сарф меъёри (л/га)	Қўллаш муддати ва усуллари	Ҳосил йиғимида қанча қолганда ишлов тўхтатилади (кун)	Мавсумда неча мартаба қўлланилиши
Помидор, Бодринг	Шира, Трипс, Оққанот, Каналар	0,75-1,5	Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади	20-30	3

ENTOVIDOR

Инсектоакарицид

(Спиродиклофен 24%)

Каналарга қарши
қўлланиладиган
самарали восита!



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат боз-ток ва забзавот экинларидаги ўсимликхўр каналарнинг барча ривожланиш босқичларига (личинка ва етук-имаго) қарши самарали таъсир этади. Ҳар қандай об-ҳаво шароитида ҳам зарарқунандага тез таъсир этади. Препарат тизимсиз таъсирга эга бўлганлиги туфали эркак ҳашаротларга нисбатан танловчан бўлиб, эркак зод нобуд бўлмаса ҳам кам сонли бўлгани учун экинга зиён етказмайди.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Зарарқунандалар	Сарф меъёри (л/га)	Қўллаш муддати ва усуллари	Мавсумда неча маротаба қўлланиши
Вўза	Вграмчаккана	0,25-0,3	Всимликнинг ўсув даврида пуркалади	2
Олма	Каналар	0,25-0,5		
Узум	Намат канаси	0,25		



FLUR

Акарицид

(Бифеназат 40%)

**Каналарга қарши самарали
таъсир қилувчи фойдали
хашаротлар учун мутлақо
зарарсиз препарат!**



Таъсир этиш хусусияти:

Flur препарати мевали боғлар, тоқзорларда зарар келтираётган турли хил сўрувчи каналарга, айниқса ғўза майдонларидаги ўргимчакканага қарши самарали восита. Препарат текканда таъсир қилувчи хусусиятга эга бўлганлиги сабабли зараркунандаларни нобуд бўлганини қисқа муддатда қўриш мумкин. Препарати билан ишлов ўтказилган майдонларда каналар гиперактив ҳолатига тушади ва 3 соат ичида озиқланишни тўхтатади ҳамда нобуд бўлади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Зараркунандалар	Сарф меъёри (л/га)	Қўллаш муддати ва усуллари	Ҳосил йиғимида қанча қолганда ишлов тўхтатилади (кун)	Мавсумда неча маротаба қўлланилиши
Ғўза	Ўргимчаккана	0,5-0,7	Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади	-	2
Олма	Каналар	0,75-1,0		30	
Узум	Намат канаси, Ўргимчаккана	0,5-0,7		30	



LOADER

Инсектицид

(Бупрофезин 40%)

*Иссиқхона экинларидаги
оққанотга қарши самарали
таъсир этувчи инсектицид!*



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат иссиқхоналардаги помидор ва бодрингдаги оққанотга қарши курашда қўлланиладиган восита ҳисобланади. Бошқа шу типдаги кимёвий воситаларга нисбатан кам заҳарлилиги билан ажралиб туради.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Зараркунандалар	Сарф меъёри (л/га)	Қўллаш муддати ва усуллари	Ҳосил йиғимида қанча қолганда ишлов тўхтатилади (кун)	Мавсумда неча мартаба қўлланилиши
Помидор, Бодринг	Оққанот	0,4	Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади	20	1



PROFENTRIN

Инсектицид

(профенофос 30%
люмбадацигалотрин 1,5%)

Сўрувчи ва кемирувчи
зараркунандаларга қарши
қўлланиладиган самарали
восита!



Таъсир этиш хусусияти:

Қишлоқ хўжалиги экинларида учрайдиган ўргимчаккана, шира, трипс, каналар, оққанот ва бошқа зараркунандаларга қарши самарали инсектоакарицид.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Зараркунандалар	Сарф меъёри (л/га)	Қўллаш муддати
Ғалла	Шира, трипс, хасва ва шилиққурт	0,5	Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади
Маккажўхори	Каналар, оққанот	1,0	
Маккажўхори	Маккажўхори парвонаси каналар	0,8 - 1,0	
Мевали боғ	Шира, трипс, қалқонеррлар ва мева хўрлар	0,8 - 1,0	

DUET EKSTRA

Инсектофунгицид

**(Тиометоксам 35%
дифенконазол 20%)**

**Сўрувчи зараркунандалар ва
касалликларга қарши самарали
восита!**



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат бир вақтнинг ўзида ҳам зараркунандаларга, ҳам касалликларга қарши қўлланилади. Зараркунандалардан шира, трипс, оққанот, ғалла пашшалари, зарарли хасва, шиллиққурт, касалликлардан парша (калмараз, раға), уншудринг, клястероспориоз, коккомикоз, қарши юқори самарали ҳисобланади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Зараркунандалар	Сарф меъёри (кг/га)	Қўллаш муддати ва усуллари
Ўза	Шира, трипс, оққанот	0,2 - 0,3	Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади
Бугдой	Хасва, шиллиққурт, шира швед пашаси, трипс, занг	0,25	
Олма	Ширалар ва ун шудринг, парша (калмараз, раға)	0,2-0,3	



IFO SERA

Акарофунгицид

(Олтингузурт 72 %)

Токзорлардаги оидиум, олмадаги уншудринг ва каналарга қарши қўлланиладиган олтингузурт асосли восита!



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат экинлар касаллик қўзғатувчиларга қарши текканда таъсир этувчи самарали фунгицид. Шу билан бирга каналарга қарши кенг таъсир доирали акарицид. Препарат қўлланган экинлардаги касалликнинг зарарли патоген хужайларининг яшаш жараёнларини тўхтатади. Таъсир давомийлиги 7-10 кунни ташкил қилади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Зараркунандалар	Сарф меъёри (л/га)	Қўллаш муддати ва усуллари	Мавсумда неча мартаба қўлланилиши
Ёўза	Ўргамчаккана	1,0-4,0	Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади	2-3
Ток	Оидиум	1,0-4,0		
Олма	Уншудринг, парша	1,0-6,0		
Помидор, Бодринг	Уншудринг	1,0-2,0		1

IFO BORDO

Фунгицид

(Мис элементи 20%)

Замбуруғли ва бактериал касалликлардан ишончли ҳимоя қилади!



Таъсир этиш хусусияти:

Препарат таркибидаги мис элементи экинларга тавсия этилган меъёрда қўлланганда замбуруғли ва бактериал касалликлардан ишончли ҳимоя қилади. Кеч кузда дарахт барглари 60-70 % тўқилганда қўлланилиши мевали дарахтларни касаллик спораларидан холи ҳолда қишловга кетишини таъминлайди. Эрта баҳорда куртақлар уйғонмасидан қўлланиши, қишловдан талофатсиз чиққан замбуруғ спораларига қарши самарали таъсир кўрсатиб, мавсум давомида касалликлардан ишончли ҳимоя тизимини яратади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Касаллик номи	Сарф меъёри (кг/100 л)	Қўллаш муддати	Ҳосил йиғилишига қанча қолганда тугатилади	Мавсум давомида қўллаш сони
Уруғли ва данакли боғлар (олма, нок, ўрик, гилос, шафтоли ва х.к)	Парша (калмараз), монилиоз, кластероспориоз, доғланишлар, барг бурмаси	3,0-5,0	Кузги қўллаш: Дарахтлар уйқуга кетганида (3-5 % лик)	20-30 кун	3-4 мартаба
		1,0-3,0	Эрта баҳорги қўллаш: Куртақларга амал қирмасидан олдин (1-3 % лик)		
		0,5-1,0	Ўсимлиқнинг барча ўсув даврида (гуллашдан кейин)		
Ток	Оидидум, милдью, антракноз, фоммоз, бактирал рак	3,0	Кузги қўллаш: Қўчатлар уйқуга кетганда, қўмишдан олдин (3 % лик)	20-30 кун	3-4 мартаба
		1,0-3,0	Эрта баҳорги қўллаш: куртақларга амал қирмасидан олдин (1-3 % лик)		
		0,5-1,0	Ўсимлиқнинг барча ўсув даврида (гуллашдан кейин)		
Помидор ва картошка	Фитофтороз	0,5-1,0	Ўсимлиқнинг барча ўсув даврида	20-30 кун	3 мартаба



ENTOXLOROK

Фунгицид

(Миснинг хлорли оксиди 85%)

**Мильдю ва антракнозга
қарши самарали восита!**



Таъсир этиш хусусияти:

Замбуруғли касалликлардан ҳимоя қилувчи ва даволовчи фунгицид. Картошкадаги фитофтороз, альтернариоз, тоқдаги мильдю, бодрингдаги пероноспороз, помидордаги фитофтороз, макроспориоз, касалликларига қарши юқори самара беради. Таркибида икки хил таъсир этувчи моддаси борлиги бошқа фунгицидларга чидамлилиги ошган касалликларни ҳам даволайди. Препарат қўлланилгандан сўнг ўсимликларни ўсиш ва ривожланишига зарарли таъсир этмайди.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Касалликлар	Сарфлаш меъёри (кг/га)	Қўллаш муддати ва усули
Ток	Мильдю, антракноз	1,2 - 4,0	Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади
Боғлар	Тешикчали доғланиш, бағр бужмалоғи		

ENTOXLOROK Plus

Фунгицид

(Миснинг хлорли оксиди 39,75% +
цимоксанил 4,2%)

**Замбуругли касалликларга
қарши самарали восита!**



Таъсир этиш хусусияти:

Юқори самарали фунгицид бўлиб, қўлланилгандан кейин касалликларни узоқ вақт назорат қилади. Картошкадаги фитофтороз, альтернариоз, тоқдаги мильдю, бодрингдаги переноспориоз, очик ва ёпиқ грунт помидордаги фитофтороз, макроспориоз, касалликларига қарши қўлланилади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Касалликлар	Сарфлаш меъёри (кг/га)	Қўллаш муддати ва усули
Ток	Мильдю	2,5-3,0	Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади
Картошка	Фитофтороз, макроспориоз, альтернариоз	2,0-2,5	
Бодринг	Переноспориоз		
Помидор	Фитофтороз, макроспориоз		



ENTOXLOROK Ekstra

Фунгицид

(Манкоцеб 64% + Цимоксанил 8%)

*Муаммоли замбуруғли касалликларга,
айниқса, тоқдаги милдьюга қарши
қўлланиладиган юқори самарали
фунгицид!*



Таъсир этиш хусусияти:

Замбуруғли касалликлардан ҳимоя қилувчи ва даволовчи фунгицид. Картошкадаги фитофтороз, альтернариоз, тоқдаги милдью, бодрингдаги пероноспороз, помидордаги фитофтороз, макроспориоз, касалликларига қарши юқори самара беради. Таркибида икки хил таъсир этувчи моддаси борлиги бошқа фунгицидларга чидамлилиги ошган касалликларни ҳам даволайди. Препарат қўлланилгандан сўнг ўсимликларни ўсиш ва ривожланишига зарарли таъсир этмайди.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Касалликлар	Сарфлаш меъёри (кг/га)	Қўллаш муддати ва усули
Картошка	Фитофтороз	1,5	Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади
Помидор	Фитофтороз, пероноспороз		Очиқ грунтдаги ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади
Ток	Милдью		Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади

ENTOLIKUR

Фунгицид

**(Требуканоз 12,5% +
Триадимефон 10,0%)**

**Занг, уншудринг ва замбуруғли
касалликларга қарши фунгицид!**



Таъсир этиш хусусияти:

Занг, уншудринг, доғланиш, пирикулярноз, оидиум, антракноз каби замбуруғли касалликларга қарши қўлланилади. Препарат тизимли таъсирга эга бўлган ҳимоя қилувчи ва даволовчи фунгицид. Ҳосилнинг йўқолиши ва касаллик кенг тарқалиб кетишининг олди олинади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Касалликлар	Сарфлаш меъёри (л/га)	Қўллаш муддати ва усули
Бугдой	Занг, уншудринг, доғланиш касалликлари	0,3-0,5	Ўсимликларнинг ўсув даврида пуркалади
Ток	Антракноз, оидиум	0,15-0,25	Ўсимликнинг 4-5 барг даврида ва 30 кундан сўнг иккинчи маротаба
Шоли	Ун шудринг	0,4	Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади



TOP KROP

Фунгицид

(Пропиконазол 20%
тебуконазол 20%)

*Бугдойдаги занг ва септориоз
касалликларга қарши самарали
восита!*



Таъсир этиш хусусияти:

Фалла майдонларидаги майсаларнинг сариқ ва қўнғир занг, уншудринг, сариқ доғланиш, қўнғир доғланиш ва бошқа касалликларига қарши юқори самарали фунгицид бўлиб, узоқ муддат ўз таъсир кучини сақлаб туради.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Касалликлар	Сарфлаш меъёри (л/га)	Қўллаш муддати ва усули
Фалла	Септориоз ва бошқа доғланиш касалликларига	0,2-0,3	Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади

PROZOLIN

Фунгицид

*(Пропиконазол 210 г/л +
тебуконазол 210 г/л)*

**Занг ва уншудринг
касалликларига қарши
қўлланиладиган фунгицид!**



Таъсир этиш хусусияти:

Галла майдонларидаги сариқ ва қўнғир занг, уншудринг, сариқ доғланиш, қўнғир доғланиш ва бошқа замбуруғли касалликларга қарши қўлланиладиган юқори самарали фунгицид бўлиб, касалликларга қарши узоқ муддат ўз таъсир кучини сақлаб туради.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Касалликлар	Сарфлаш меъёри (л/га)	Қўллаш муддати ва усули	Мавсумда неча маротаба қўлланилиши
Галла	Сариқ ва қўнғир занг, уншудринг	0,16-0,2	Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади	1-2



ENTO PAZ EKSTRA

Фунгицид

(Пенконазол 10%)

**Уншудринг ва бошқа замбуругли
касалликларга қарши тизимли
таъсир этувчи фунгицид!**



Таъсир этиш хусусияти:

Экинлардаги уншудрингга қарши касалликнинг илк босқичларида қўлланганда юқори самара берувчи фунгицид. Шунингдек мевали бовлардаги мева чириш, парша, тоқдаги оидиум, донли экинлардаги уншудринг, занг ва септориоз каби касалликларга қарши даволовчи ҳамда ҳимоя қилувчи тизимли таъсирга эга препарат ҳисобланади. Ушбу препарат ўсимликнинг хужайрасида ҳаракатланиб, споралар ривожланиши ҳамда барг тўқималарида кириш даврида касалликни даволайди. Касалликларга қарши курашиш даври препарат қўллангандан бошлаб 10-14 кун давом этади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Касалликлар	Сарф меъёри (л/га)	Қўллаш муддати ва усули	Мавсумда неча мартаба қўлланилиши
Помидор, Картошка, Бодринг	Футофтороз, Уншудринг, Пероноспороз	0,2-0,5	Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади	2
Ток	Оидиум	0,2-0,25		4
Олма	Уншудринг, Мева чириш	0,2-0,3		3

KREZOKSIN

Фунгицид

(Крезоксим-метил 50%)

**Уншудринг ва паршага қарши
самарали восита!**



Таъсир этиш хусусияти:

Препарат юқори ва сифатли ҳосил олишда муҳим аҳамият касб этишини кўп бора исботлаб келмоқда. Уншудринг, калмараз (раға, парша), оидиум, мильдю, антракноз, переноспориоз, фитофтороз, кладоспориоз, альтернариоз, макроспориоз ва бошқа касалликларига қарши юқори самара берувчи фунгицид.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Касалликлар	Сарфлаш меъёри (кг/га)	Қўллаш муддати ва усули
Олма	Уншудринг, калмараз(раға)	0,2	Ўсимликларнинг ўсув даврида пуркалади



ADDRESS

Фунгицид

(Азоксистробин 25%)

**Токдаги замбуруғли касалликларга
қарши қўлланиладиган тизимли
таъсир этувчи фунгицид!**



Таъсир этиш ҳусусияти:

Ушбу препарат токдаги мильдю, оидиум, помидордаги фитофтороз, альтернариоз, уншудринг, бодрингдаги пероноспороз, уншудринг ва бошқа замбуруғли касалликларга қарши курашишда қўлланилади. Препарат қўллангандан сўнг касаллик спораларини ривожланишини блоклайди ва тарқалишини олдини олади. Ўсимликларнинг касалликларга қарши курашиш қобилиятини оширади ва ривожланишини тезлаштиради. Препаратни қўллашда юқори натижага эришиш учун экинлардаги касалликларни илк белгилари кўрина бошлаганда қўллаш лозим.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Касалликлар	Сарфлаш меъёри (кг/га)	Қўллаш муддати ва усули	Ҳосил йиғимига қанча қолганда ишлов тўхтатилади (күн)	Мавсумда неча маротаба қўлланилади
Помидор	Фитофтороз, Альтернариоз, Уншудринг	0,4-0,6	Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади	30	2
Бодринг	Уншудринг, Пероноспороз			25	
Ток	Мильдю, Оидиум	0,8			

IFODODIN

Фунгицид

(Додин 40%)

*Уруғли боғлардаги парша ва
монилиозга қарши тизимли таъсир
этувчи восита!*



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат олма ва нок боғларидаги парша ҳамда монилиоз касалликларига қарши терапевтик ва узоқ муддатли профилактик таъсир кўрсатадиган фунгицид. Ушбу фунгицид ичдан таъсир этувчи фунгицидлар туркумига киради. Касаллик белгилари бошланганидан 3-4 кун ўтгач, доимий қўлланиб келинаётган кимёвий воситалар самарасиз бўлганда касалликни авж олишини тўхтатишга ёрдам берадиган трансламинар фаолликка эга препарат ҳисобланади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Касалликлар	Сарфлаш меъёри (л/га)	Қўллаш муддати ва усули	Ҳосил йиғимида қанча қолганда ишлов тўхтатилади (кун)	Мавсумда неча маротаба қўлланилади
Олма, Нок	Парша, Монилиоз аччи иириш	1,0-2,0	Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади	30	1-2



RAMZES

Фунгицид

(Зирам 76%)

**Калмараз, қўнғир доғланиш,
шафтолидаги барг
бужмалоқланиши
ва клястероспориоз
касалликларига
қарши самарали восита!**



Таъсир этиш хусусияти:

Олмадаги калмараз, қўнғир доғланиш, шафтолидаги барг бужмалоқланиши ва клястероспориоз касалликларига қарши юқори самара берувчи фунгицид бўлиб, қўлланилгандан 3-4 соат ўтиб таъсир қилишни бошлайди. Таъсир этиш давомийлиги касалликнинг жиддийлиги ва об-хаво шароитларига бовлиқ ҳолда 4-6 ҳафтагача давом этади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Касалликлар	Сарфлаш меъёри (кг/га)	Қўллаш муддати ва усули
Олма	Калмараз, қўнғир доғланиш	3,0	Ўсимликка гуллашигача ва гуллашидан кейин пуркалади
Шафтоли	Барг бужмалоқланиши ва клястероспориоз		
Ўрик, гилос	Тешикчалик доғланиш клястероспориоз		

LEKOVIT

Фунгицид

(Дитианон 70%)

**Ток, олма ва шафтоли
боғларидаги касалликларга
қарши кенг спектрда таъсир
этувчи ноёб комбинацияли
фунгицид!**



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат ҳимоя қилувчи ва долововчи таъсирга эга текканда таъсир этувчи фунгициддир. Препарат мевали боғлардаги касаллик келтириб чиқарадиган замбурув турларига қарши курашда юқори фаоллиги билан бошқа фунгицидлардан ажралиб туради. Шу билан бирга препаратнинг таъсири самараси ҳарорат шароитларига боғлиқ эмас. Ўсимликнинг барча ўсув даврида қўллаш мумкин.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Касалликлар	Сарфлаш меъёри (кг/га)	Қўллаш муддати ва усули	Мавсумда неча мартаба қўлланилиши
Шафтоли гилос рик ол ри	Клястероспориоз (Тешикчали доғланиш)	0,5-0,8	Ўсимликка гуллашигача ва гуллашидан кейин пуркалади	2-3



MERSIN

Фунгицид

(Тиафанат-метил 70%)

**Касаллик қўзғатувчи патогенларга
тўғридан-тўғри таъсир қилувчи
ҳамда ўсимлик тўқималарига сингиб,
текканда ва тизимли таъсирга эга
фунгицид!**



Таъсир этиш хусусияти:

Препаратининг таъсир доираси кенг бўлиб, сабзавот экинларидаги уншудринг ва церкоспороз, бодрингнинг фузариоз ва кулранг чириш, тоқзорлардаги антракноз касалликлари ҳамда данакли ва уруғли бовлардаги коккомикоз ва парша каби кўп қиррали касалликларига қарши қисқа муддатларда таъсир кўрсатади. Ушбу препарат 14 кундан ортиқ давом этадиган узоқ муддатли ҳимоя таъсирига эга бўлиб, тизимли таъсири уни бутун ўсимлик бўйлаб тез тарқалишига имкон беради. Терапевтик ва профилактик хусусиятларни ўзида жамлаган ушбу фунгицид, касалликларни йўқ қилишдаги самараси билан ажралиб туради.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Касалликлар	Сарфлаш меъёри (кг/га)	Қўллаш муддати ва усули	Ҳосил йиғимига қанча қолганда ишлов тўхтатилади (кун)	Мавсумда неча мартаба қўлланилади
Бодринг	Уншудринг, Кулранг чириш	1,0	Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади	10	3
Ток	Антракноз			30	
Олма	Уншудринг, Монилиоз, Парша		Дарахтларга гуллашигача ва гуллаганидан кейин 0,1%ли суспензия ҳолида пуркалади	20	

GEMAKSIL

Бактерицид, фунгицид

(Гимексазол 36%)



Таъсир этиш хусусияти:

Ўсимликларни фитопатоген замбурувлар келтириб чиқарадиган касалликлардан ҳимоя қилиш учун тизимли бактерицид фунгициддир. Экинлардаги уншудринг, фитофтороз касалликларига қарши юқори самарага эга. Препарат қўлланган майдондаги ўсимликларнинг ҳаётий жараёнларини яхшилайти, илдииз ўсишини рағбатлантиради, ўсимликларнинг стресс омилларига, хусусан, паст ҳарорат ва қуруқчиликка чидамлилигини оширади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Касалликлар	Сарфлаш меъёри (л/га)	Қўллаш муддати ва усули	Мавсумда неча мартаба қўлланилиши
Помидор картошка	Фитофтороз, Уншудринг	0,1	Ўсимликларнинг ўсув даврида пуркалади	1-2
Бодринг	Уншудринг			



FOSETAL

Фунгицид

(Алюминий фосетил 80%)

**Бактериал куйишга қарши
юқори самарали фунгицид!**



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат юқори самара берувчи фунгицид бўлиб, қўлланилгандан кейин касалликларни узоқ вақт назорат қилади. Олмадаги замбуруғли касалликларга, бактериал куйиш касаллигига қарши юқори самарали фунгицид. Гектарига 1,5-3,0 кг миқдорда қўлланилади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Касалликлар	Сарфлаш меъёри (кг/га)	Қўллаш муддати ва усули	Ҳосил йиғишга қанча қолганда ишлов тугалланади (кун)
Олма, нок	Бактериал куйиш	1,5-3,0	Ўсимликларнинг ўсув даврида пуркалади	30

ENTREVICUR

Фунгицид

(Пропамокарб гидрохлорид 72,2%)

**Фитофтороз ва альтернариоз
касалликларига қарши самарали
восита!**



Таъсир этиш хусусияти:

Ўйзадаги фитофтороз, помидордаги фитофтороз ва альтернариоз ҳамда илдиш касалликларига қарши юқори самара беради. Препарат ўсимликларни касалликлардан ҳимоя қилибгина қолмай, уларнинг гуллаши ва ривожланишига ижобий таъсир кўрсатади. Препарат қўлланилгандан сўнг 3-4 соат ўтиб таъсир қилишни бошлайди.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Касалликлар	Сарфлаш меъёри (л/га)	Қўллаш муддати ва усули
Помидор	Фитофтороз ва альтернариоз орасон	1,5	Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади



FLUTRIFUL

Фунгицид

(Флутриафол 25%)

*Замбуруғли касалликларга қарши
текканда ва тизимли таъсир этувчи
фунгицид!*



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат токдаги оидиум, мевали боғлардаги уншудринг, парша, галла майдонларидаги қўнғир ва сариқ занг, уншудринг, септориоз каби касалликлар турларига қарши текканда ва тизимли таъсир этувчи фунгицид ҳисобланади. Препарат ўсимлик томонидан тез сўрилади ва ёғин билан ювилиб кетмайди. Паст ҳароратларда ҳам касалликларга нисбатан таъсир кучи камаймайди. Препарат қўлланган майдонларда касалликни узоқ вақт назорат қилади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Касалликлар	Сарфлаш меъёри (л/га)	Қўллаш муддати ва усули	Ҳосил йиғимига қанча қолганда ишлов тўхтатилади (кун)	Мавсумда неча маротаба қўлланилади
Галла	Сариқ ва қўнғир занг, уншудринг, доғланиш	0,2-0,5	Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади	30,0	1-2
Ток	Оидиум	0,1-0,15			2
Олма	Уншудринг, парша	1,0			2-3

ARAMIS

Фунгицид

(Boscalid 25% + Pyraclostrobin 12%)

**Аччиқ чириш касалликларга
қарши самарали восита!**



Таъсир этиш хусусияти:

Олма, нок ва бошқа меваларда парша, уншудринг каби замбуруғли касалликларга қарши ҳамда меваларни сақлашдаги қузатиладиган монилиал, пенициллез ва аччиқ чириш касалликларга қарши қўлланиладиган юқори самарали фунгицид. Ушбу препарат иккита таъсир этувчимоддага эга бўлган янги турдаги фунгицид бўлиб, экинни ўсув даврида замбуруғли касалликлардан ҳимоя қилиш билан бирга, унинг меваларини сақлашда ҳам чириш касалликларидан ҳимоя қилади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Касалликлар	Сарф-меъёр (кг/га)	Қўллаш муддати ва усуллари	Мавсумда неча мартаба қўлланиши
Олма, нок	Уншудринг, парша	0,8	Экинларнинг ўсув даврида ғунчалашдан то мевалар ҳосил бўлгунга қадар 10-14 кун оралиқда пуркалади. Ишчи зритма сарфи гектарига 1000 литргача	3-4
	Меваларни сақлаш пайтида чириш касалликларига қарши: монилиал, пенициллез ва аччиқ чириш касалликлари		Мевалар ҳосил бўлгандан сўнг теримга 10 кун қолгунга қадар пуркалади. Ишчи зритма сарфи гектарига 1000 литргача	1-2



AKSESS

Фунгицид

(Хлороталонил 50%)

*Помидор ва картошкадаги
альтернариоз, фитофтороз,
бодрингдаги пероноспороз ва бошқа
замбуруғли касалликларга қарши
қўлланиладиган текканда таъсир
этувчи фунгицид!*



Таъсир этиш хусусияти:

Препарат ўсимлик вегетатив органларининг бир қатор фитопатогенларидан, жумладан, сохта уншудринг замбуруғидан узоқ муддатли ҳимоя қилади. Ҳимоя даврининг давомийлиги асосан янги ёш ўсимлик органларининг ўсиш тезлиги билан белгиланади. Ўсимликнинг юзасидаги касалликнинг споралари ва қўзғатувчи замбуруғларини ривожланишини олдини олади. Препарат қўллангандан сўнг 7-14 кун мобайнида ўсимлик барг ва мевалари устки қисмини самарали ҳимоя қилади ва натижада касаллик патогени ўсимлик ичига кира олмайди.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Касалликлар	Сарфлаш меъёри (л/га)	Қўллаш муддати ва усули	Ҳосил йиғимига қанча қолганда ишлов тўхтатилади (кун)	Мавсумда неча маротаба қўлланилади
Помидор, Бодринг, Картошка	Фитофтороз, Альтернариоз	2,5-3,0	Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади	20-30	2-3

FLUSIL

Фунгицид

(Флусилазол 40%)

*Парша ва оидиум қарши самарали
восита!*



Таъсир этиш хусусияти:

Экинлардаги уншудринг, оидиум, калмараз, мева чирishi каби касалликларга қарши курашда қўлланилади. Ҳосилнинг йўқолиши ва касаллик кенг тарқалиб кетишининг олдини олади

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Касалликлар	Сарфлаш меъёри (л/га)	Қўллаш муддати ва усули
Ток	Оидиум	0,05-0,06	Ўсимликларнинг ўсув даврида пуркалади
Олма	Парша, уншудринг	0,05-0,075	



КАРИТОКС

Фунгицид

(Каптан 50%)

*Мевали дарахтларни калмараз, мева
чириши ва бошқа замбуруғли
касалликлардан ҳимоя қилишда
қўлланиладиган юқори самарали
фунгицид!*



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат мевали дарахтларнинг касалликларини олдини олиш мақсадида профилактик ишлов бериш усули билан қўлланилади. Мевали дарахтлардаги калмараз, мева чириши, бир неча турли замбуруғли касалликларга қарши қўлланилади. Шу билан бирга, экинлардаги бактериоз касаллигини олдини олишда ҳам юқори самара беради. Қўлланилгандан кейин ҳаво ҳарорати юқори бўлганда ҳам касалликларга таъсири ўзгармайди

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Касалликлар	Сарфлаш меъёри (кг/га)	Қўллаш муддати ва усули
Олма	Парша (калмараз)	1,5	Ўсимликларнинг ўсув даврида пуркалади

ENTOBRONAT

Фунгицид-бактерицид

(Бронопол 12%)

*Ўзанинг гоммоз касаллигига қарши
уруғ дорилангич восита!*



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат ўйза майдонларидаги гоммоз фитопатоген касалликларга қарши уруғ дорилангич ҳисобланадиган моддаларни ўз ичига олади. Бактерияларнинг *Pseudomonas* турига қарши юқори самарали ҳисобланади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Касалликлар	Сарф меъёри (кг/га)	Қўллаш муддати ва усуллари
Ўйза	Гоммоз	6,0-7,0	Чигит препарат суспензиясида 1 т туқли чигитга 25-30 л ва 1 т механик усулда туқсизлантирилган чигитга 15-20 л эритма сарфлаб дориланади.



IFO TEBU

Уруғ дорилагич

(Тебуконазол 6%)

Бугдойни чанг ва қаттиқ қорақуя касалликларига қарши уруғларни дорилашда қўлланиладиган уруғдорилагич!



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат галла майдонларидаги чанг ва қаттиқ қорақуя ҳамда илдиз чириш касалликларига қарши уруғлик галлани дорилашда қўлланиладиган уруғдорилагич.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Касалликлар	Сарф меъёри (л/тонна)	Қўллаш муддати ва усуллари
Галла	Чанг ва қаттиқ қора қуя, илдиз чириш	0,5	Экишдан аввал 1 тонна уруғ учун 10-15 л сувга тавсия этилган меъёрда препарат қўшиб, ишчи эритма тайёрлаб дориланади.

ENTOVAKS

Уруғ дорилагич

(Карбоксин 37,5% + тирам 37,5%)

**Чанг, қаттиқ қорақуя ҳамда
ғўзадаги илдиз чириш касалликларига
қарши қўлланиладиган
самарали уруғ дорилагич.**



Таъсир этиш хусусияти:

Галладаги чанг ва қаттиқ қорақуя ҳамда ғўзадаги илдиз чириш касалликларига қарши уруғларни дорилашда қўлланиладиган препарат. Ушбу препарат бир вақтнинг ўзида фунгицидлик ва ўсувни бошқариш хусусиятларига эга. Препарат таркибидаги карбоксин ўсувни бошқариб, уруғ ичидаги инфекцияларга қарши курашса, тирам эса уруғнинг қобиқ қатламини инфекциялардан қимоя қилади. Ўзининг даволовчи ва қимоя қилувчилик хусусиятлари, шунингдек уруғларнинг униб чиқиши ва фаол ривожланишини кучайтириши ҳисобига юқори ва сифатли ҳосил олишни таъминлайди.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Касалликлар	Сарф меъёри (1 тонна уруғ учун, кг)	Қўллаш муддати ва усуллари
Галла	Чанг ва қаттиқ қора қуя	2-3	Уруғ препарат суспензиясида 1 тонна донга 10 литр ишчи эритма сарфланган ҳолда дориланади
Ғўза	Илдиз чириш	3-4	Чигит препарат суспензиясидан 1 тонна тукли чигитга 25-30 литр ва 1 тонна механик туксизлантирилган чигитга 15-20 литр ишчи эритма сарфланган ҳолда дориланади



ENTOPIKS

Стимулятор

(Мепикват хлорид 5%)

**Ўўза ўсишини тартибга солувчи
ва кўсакларни етилишини
тезлаштирувчи восита!**



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат ўўза зовлаб кетишини олдини оладиган, ўсимликни вегетатив ва генератив ўсувини бошқарадиган стимулятор ҳисобланади. Ўўзанинг бўғин оралиғини қисқартириб, ҳосил элементларини шакллантиради. Препарат билан ишлов берилган ўсимлик ихчам ҳолга келиб, конуссимон шакл олади, соғлом тўқ яшил рангга киради. Иккинчи мартаба қўлланилганда ўсув нуқтасини сезиларли даражада ўсишдан тўхтатиб, механик усулда чилпиш ишларини бажаришга зарурат қолдирмайди. Шу билан бирга биринчи теримда олинадиган ҳосил миқдори ортади. Толанинг техник сифатига салбий таъсир қилмайди.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Сарф меъёри	Қўллаш муддати
за	0,5-1,5	Қусак шаклланиш ва пишиш даври
Дуккакли экинлар	0,5-1,0	Гуллаб, ҳосил тугиш даври
алла	0,5-1,0	Найчалаш даври

ENTOJEAN

**Ўсиш ва риважланишни
бошқарувчи препарат!**

(Мепикват хлорид 98%)

Қисқа бўғин - мўл ҳосил!



Таъсир этиш ҳусусияти:

Ушбу препарат ўйза ғовлаб кетишининг олдини олади. Бунинг натижасида ўзанинг пастки қисмида асосий кўсақлар пайдо бўлиб, улар эрта очилади ва юқори ҳосил олишга имконият яратилади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Қўллаш мақсади	Сарф меъёри (г/га)	Қўллаш муддати ва усуллари
Ўйза	7-8 чин барг чиқариб шоналаганда, илдиз қисмини бақувват қилишга	15	Ўсимликларни ўсув даврида пуркалади
	Ўйзани бақувват қилиб, шонани кўпайтириб, гуллашни тезлатишга	45	
	Ўйзани ғовлашини олдини олишга, ҳосил элементларини кўпайишга	90	
алла	Кучли шамолда ётиб олишга арши	20-30	Найчалаш даври



HOSILIN

**Ўсиш ва ривожланишни
бошқарувчи препарат**

(Гибберлин 20%)



Таъсир этиш хусусияти:

Ўсимликнинг ўсиши ва ривожланишига фаол таъсир кўрсатадиган ўсувни бошқарувчи таблетка шаклидаги модда. Препарат мураккаб тузилмали органик кислота бўлиб, ўсимликнинг ўсиши ва ривожланишига фаол таъсир кўрсатадиган ўсув моддасидир. Гибберлин билан ишлов бериш ўсимликнинг пояси, шохлари, барги ўсиши; меваси тез етилиши, уруғини тез униб чиқиши ва кўчатларнинг ўсишини тезлатади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Мақсади	Сарф меъёри (г/га)	Қўллаш муддати ва усуллари
Ток	Ҳосилни қўпайтириш	50-100	Ўсимликнинггуллаш ва меваси шаклланган даврида пуркалади
Пиёз	Ҳосилни катта лаштириш		
Уру ли бо лар	Ҳосилни катта лаштириш	50-100	Ўсимликнинггуллаш ва меваси шаклланган дав

ЭКС-ЧЕЙНДЖ

Сувни мўтадиллаштирувчи препарат

Таркиби: Кондиционерлаштирувчи агентлар, кўпиклашга қарши моддалар ва қўшимча компонентлардан иборат эрувчан концентрат



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат қишлоқ хўжалигида қаттиқ сувларни юмшатиш ва сувлардаги юқори ишқорийликни пасайтириш учун қўлланилади. Бундай турдаги препаратлар амалиётда сув кондиционери деб аталади. X-CHANGE - ўсимликларни ҳимоя қилиш воситалари ва ўғитларнинг ишчи эритмаларини тайёрлашда қўлланилади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Препарат қўлланилаётган умумий сув миқдорининг 0,1-0,25% и миқдоридagi концентрацияларда қўлланилади. Бунда қўллаш учун сувнинг қаттиқлик ва ишқорийлик даражалари махсус асбобда ўлчаб олинади. Агар сувнинг қаттиқлиги ва ишқорийлигини ўлчаш мумкин бўлмаган ҳолатларда қўлланидиган сув умумий миқдорининг 0,25% миққоридa препарат қўлланилади. Препаратини қўллашда бакнинг 80-90% и сувга тўлдирилади ва аралаштиргич ишга туширилади. Аралаштиргич ишлаб турган ҳолатда бакка препаратнинг аниқ миққори қўшилади ва аралаштириш давом эттирилади. Сўнгга қўлланиши кўзда тутилган пестицид ва ўғитларнинг аниқ миққори қўшилиб, аралаштириш давом эттирилади ҳамда бакнинг қолган қисми сувга тўлдирилади.



SIKLODEFOL

Ўсувни бошқарувчи модда

(Этефон 72%)

**Ўйза қўсақларини етилиши ва
очишлишини тезлаштиришда
қўлланиладиган юқори самарали
ўсувни бошқарувчи модда!**



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат ўйза қўсақларини етилишини ва очишлишини тезлаштирилади. Натижада пахта ҳосилини эрта муддатларда қулай иқлим шароитларда териб олиш имконияти яратилади. Ўйза экинни тепа қисмидаги очилмай қолган қўсақлар очишлиши натижасида пахтани бир теримда ва юқори ҳосилдорликда йиғиб олинади. Пахта теримида сарфланадиган қўшимча ишчи кучи ва ҳаражатларнинг олди олинади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Мақсади	Сарф меъёри (л/га)	Қўллаш муддати ва усуллари
Ўйза	Қўсақларнинг етилиши ва очишлишини тезлаштириш	1,5-2,0	Қўсақнинг 40-45 фоизи очилганда пуркалади

ENTO-DEFOL

Дефолиант

(Тидиазурон 36% + диурон 38%)

Ўрта ва ингичка толали гўзани дефолиация қилишда қўлланиладиган самарали препарат!



Таъсир этиш ҳусусияти:

Ўрта ва ингичка толали гўзани дефолиация қилишда қўлланиладиган препарат бўлиб, 12 соат давомида ўсимлик барглари орқали сингади. Препаратнинг илк самараси ишлов берилгандан 2-4 кундан сўнг қўринади. Препарат ўсимлик хужайраларининг бўлинишини тезлаштиради, натижада барглари яшил ҳолида (қуримасдан) тўкила бошлайди. Шунингдек, препарат янги барглари ўсиб чиқишини олдини олади, очилмаган кўсакларни табиий етилишини тезлаштиради, ҳамда ҳосил сифатида зарар етказмайди.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Мақсади	Сарф меъёри (л/га)	Қўллаш муддати ва усуллари
Гўза	Дефолиация	0,1-0,2	Кўсакнинг 40-45 фоизи очилганда пуркалади



SILVER

Сирт фаол модда

(Трисилоксан аоксилат 100%)



Таъсир этиш хусусияти:

Кимёвий воситалар билан бирга қўлланилиб, уларнинг барг юзасига ёпишувчанлигини ва ўсимлик томонидан тез сўрилишини таъминлайди, шунингдек, ёмғир ёққанида ювилиб кетишини олдини олади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

СИЛВЕР сирт фаол моддаси 0,15-0,25% концентрацияларда қўлланилади. 0,25% концентрацияли максимал миқдор тизимли ва ёппасига таъсир этувчи гербицидлар билан биргаликда қўлланилади. Контакт таъсир этувчи препаратлар билан қўлланилганда Силвер сирт фаол моддасининг концентрацияси 0,15 % булиши лозим. СИЛВЕР сирт фаол моддаси ҳар доим асосий препаратлар сувга аралаштириб бўлгач қўшилса мақсадга мувофиқ бўлади. СИЛВЕР СФМ препаратини қўллашда бакнинг 80-90% сувга тўлдирилади ва аралаштиргич ишга туширилади. Аралаштиргич ишлаб турган ҳолатда бакка кўзда тутилган пестицид ва ўзгиртнинг аниқмиқдори қўшилади ва аралаштириш давом эттирилади. Сўнггра СИЛВЕР СФМ аниқ миқдори қўшилиб, аралаштириш давом эттирилади ҳамда бакнинг қолган қисми сувга тўлдирилади. Сарф меъёри 0.1-0.2 л/га.

OKSIDAT

Нематоцид

(Оксамил 24%)

Нематодаларга қарши
қўлланиладиган восита!



Таъсир этиш хусусияти:

ОКСИДАТ препарати билан иссиқхоналардаги ниҳолларнинг илдиз таъгига ишлов бериш натижасида галл ҳосил қилувчи нематодалар, оққанот ва зовакловчи пашшалар зарари олдини олади. Бу препарат кенг миқёсда дала экинлари (помидор, бодринг; пияз, мурч, булғор қалампири ва бошқалар)ни ҳимоя қилишда қўлланилади. ОКСИДАТ препарати томчилатибсузориш ёки илдизига қўйиш усуллари ёрдамида қўлланилади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Зарарли организм номи	Сарф меъёри (мл/10 литр сув)	Қўллаш муддати ва усуллари
Иссиқхонадаги помидор	нематодалар	40	Препарат 3 маротаба: Биринчи ишлов иссиқхонага кўчат экилгандан 3-5 кун ўтиб, кейинги ишловлар 15 кун оралатиб қўлланилади. Бунда 1 туп кўчатга 100 мл дан ишчи эритма сарфлаб қўлланилади.



BOLL

Нематоцид

(Фостиазат 15%)

*Экинларда учрайдиган илдиз ўт
(шумғия), нематодаларга қарши
самарали восита!*



Таъсир этиш хусусияти:

Ушбу препарат иссиқхона, сабзавотлар (помидор, бодринг), картошка ва тамаки каби бир қатор экинлардаги нематодаларга қарши органофосфат нематоциддир. Препарат текганда ва тизимли таъсир эга, дастлабки нематостатик таъсирга эга бўлиб, у тупроқда нематодалар ҳаракатини тўхтатади ва натижада нематодал таъсир кўрсатади. Препарат илдиз тизимидаги нематодалар, зараркунандаларга қарши фумигант таъсир эга.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури	Зарарли организм номи	Сарф меъёри (кг/га)	Қўллаш муддати ва усуллари	Ҳосил йигимига қанча қолганда ишлов тўхтатилади (кун)	Мавсумда неча мартаба қўлланилиши
Помидор	Нематодалар	20,0	Ер тайёрлаш даврида тупроқга 10-15 см чуқурликда солиб ишланади	30,0	1

Худуд номи	Филиал номи	Телефон раками	Худуд агрономи
Қорақалпоғистон Республикаси	Қорақалпоғистон	+99891181-32-00	+998 91180-45-00
	Нукус	+99891292-32-00	+998 91368-50-09
	Беруний	+99891178-00-12	
Андижон вилояти	Андижон	+99891292-28-00	+998 91180-44-45
	Олтинқўл	+99890640-40-52	+998 90261-20-70
Бухоро вилояти	Бухоро	+99891292-27-00	+998 91368-80-03
	Қоравулбозор	+99891178-00-19	+998 90156-58-00
Жиззах вилояти	Жиззах	+99891292-12-00	+998 91352-65-15
	Зомин	+99891178-00-24	+998 91368-70-06
	Дўстлик	+99891178-00-23	
Навоий вилояти	Навоий	+99891181-30-05	+998 91368-80-09
	Хатирчи	+99891177-00-43	+998 91340-83-00
	Қизилтепа	+99891178-00-29	
Сурхондарё вилояти	Сурхондарё	+998 91239-00-88	
	Денов	+998 91292-26-00	+998 91180-42-24
	Сариосиё	+998 91178-00-53	+998 91368-40-05
	Қизириқ	+998 91368-38-48	+998 91181-27-00
	Жарқўрғон	+998 91175-00-47	

Худуд номи	Филиал номи	Телефон раками	Худуд агрономи
Наманган вилояти	Наманган	+99891 181-23-00	+998 91 180-44-22
	Учқўрғон	+99890 551-45-07	+998 91 368-10-03
	Тўрақўрғон	+99891 178-00-34	
	Мингбулоқ	+99890 641-73-07	+998 91 177-00-32
	Янгиқўрғон	+99891 340-72-00	+998 91 180-50-90
	Чуст	+99891 178-00-38	
Қашқадарё вилояти	Қашқадарё	+99891 292-18-00	+998 91 368-70-09
	Китоб	+99891 178-00-26	+998 91 177-00-65
Самарқанд вилояти	Пахтачи	+998 93 147-89-89	+998 91 352-65-15
	Боғишамол	+998 91 368-48-08	+998 91 178-00-28
	Оқдарё	+998 91 292-17-00	+998 91 368-10-05
Сирдарё вилояти	Сирдарё	+998 91 292-14-00	+998 91 292-16-00
	Боёвут	+998 91 292-13-00	
	Тошкент	+998 91 181-21-00	+998 91 180-50-90
Фарғона вилояти	Фарғона	+998 91 178-00-42	+998 91 180-43-33
	Қўқон	+998 91 178-00-56	+998 91 292-13-00
	Ўртачирчиқ		
Фарғона вилояти	Фарғона	+998 91 181-21-00	+998 91 292-35-00
	Қўқон	+998 91 178-00-56	+998 91 366-07-59
	Ўртачирчиқ		
Фарғона вилояти	Фарғона	+998 91 292-19-00	+998 90 555-81-31
	Қўқон	+998 91 340-82-00	+998 91 180-42-22
	Ўртачирчиқ	+998 91 156-49-00	+998 91 362-06-66
Фарғона вилояти	Фарғона		+998 91 180-41-11
	Қўқон		
	Ўртачирчиқ		

Худуд номи

Филиал номи

Телефон раками

Худуд агрономи

Хоразм
вилояти

Хоразм

+99891 292-31-00

+998 91 340-80-60

Богот

+99891 177-00-34

+998 91 180-44-49

Шовот

+99891 177-00-39

+998 90 640-40-21



БИЗ БИЛАН БОҒЛАНИНГ!

Маслаҳат маркази (Call-center)
+998 78 147-05-00

Етакчи агрономлар:

+998 (91) 366 - 99-79
+998 (91) 340-80-60
+998 (91) 180-50-90
+998 (91) 352-65-15
+998 (91) 368-70-09

Боғдорчилик ва иссиқхоналар бўйича агрономлар:

+998 (91) 180-38-88
+998 (91) 340-83-00
+998 (91) 362-06-66
+998 (91) 292-16-00
+998 (90) 640-40-52
+998 (91) 292-16-00



Препаратлар

Қўлланмаси



Наманган в., г.Чуст., Зарафшон массиви
Чустнон-Дўстларобод МФЙ, Маданият к. 72



(+998 78) 147-05-00
@ifodaagroconsulting