

## ИККИСИ БИРДА: КУЧЛИ ТАЪСИР ВА МУКАММАЛ НАТИЖА!



Birgalikda yetishtiramiz!  
Вырастим вместе!  
We grow together!

# PINOKS 5 EC

**Таъсир этувчи модда:** Пиноксаден 25 г/л + Клодинафоп-пропаргил 25 г/л  
**Таъсир этиш усулига кўра гурухи:** А гербицид гурухидан бўлиб, ацетил-КоА карбоксилаза фермент ингибитори ҳисобланади.

Гербицид барг орқали сўрилади ва флоэма (луб) воситасида ўсиш нуқталарига етиб бориши натижасида мериистема фаолиятига тўқсинглик қиласди.

Препаратнинг таъсирида барг назасининг қўнғирлашиши, янги чикқан баргларнинг сарфайиши, эски баргларнинг қизил ёки тўқ сарик рангга кириши ва 1-3 ҳафтада нобуд бўлиши кузатилади.

Бу гербицид тупроқдаги микроорганизмлар орқали қисқа муддатда парчаланади.

### Қўллаш усули:

Буғдои ва бегона ўтлар униб чикқандан сўнг қўллаш тавсия этилади (post-em).

Буғдойнинг учинчи барг чиқарганидан туплашгача бўлган давр оралигидан қўллаш тавсия этилади.

Энг самарали натижага эришиш учун бегона ўтлар кўплайган ва ривожланган даврида қўллаш лозим.

Бу препарат сақланувчи таъсирга эга бўлмаганлиги сабаб, ишлов берилгандан кейин униб чикқан ингичка баргли бегона ўтларга таъсир кўрсатмайди.

Дорилашдан 2 соат сўнг ёғингарчилик бўлиши тахмин этилса, ишлов ўтказилмаслиги керак.



### САРФ МЕЪЁРЛАРИ ВА ҚЎЛЛАШ ТАРТИБИ

Экин тури	Бегона ўтлар	Сарф меъёри л/га	қўллаш муддати ва үсуллари		Мавсумда неча маротаба қўлланиши
			Экиннинг ўсиш даври	Бегона ўтнинг ўсиш даври	
Кузги ва баҳорги буғдои	Бир йиллик бошоқли бегона ўтлар	1	Экиннинг туплаш даврида	Униб чикқандан сўнг. Бегона ўтлар ривожланишининг бошланғич даврида қўлланилса яхши самара берди	1



78 147 05 00



[www.ifoda.uz](http://www.ifoda.uz)



@ifodaagroconsulting